



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO
PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE
n. 21 del 25 settembre 2026**

Sommario

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	2
CASCOLA DELLE OLIVE	4

ANDAMENTO METEO

L'alta pressione garantirà una settimana di tempo stabile, soleggiato e senza piogge in tutto il Friuli Venezia Giulia, con temperature diurne miti fino a 21-24°C ed escursioni termiche notturne.

FENOLOGIA

In tutte le zone monitorate le olive hanno completato l'accrescimento raggiungendo la dimensione massima tipica nella maggior parte delle varietà. Da questo momento in poi si osserverà nelle varietà più precoci, un'accelerazione della invaiatura, ovvero un viraggio del colore dell'epicarpo.

La tabella riporta i valori della penetrometria monitorata su alcune principali cultivar in diverse zone delle due province:

Comune	Varietà	Penetrometro gr/mm ²
Pozzuolo	Leccino	440
	Bianchera	460
Castions di S.	Leccino	470
	Bianchera	450
Latisana	Leccino	470
	Bianchera	430
Faedis	Leccino	420
	Bianchera	400
Povoletto	Leccino	490

	Bianchera	430
Osoppo	Leccino	540
	Bianchera	470
Premariacco	Leccino	520
	Grignano	480
Martignacco	Grignano	380
	Bianchera	450
	Leccino	450

Il momento ottimale per la raccolta delle olive con il penetrometro si raggiunge quando la resistenza alla penetrazione della buccia e della polpa scende a circa 300-350 grammi e/o l'invasiatura, ovvero quando la buccia dell'oliva passa dal verde brillante a tonalità gialle, rosse, violacee, è al 20%.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Polcenigo e Leccino a Caneva

SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)

Nelle zone di monitoraggio si è riscontrato un aumento di catture di adulti nell'ultima settimana, dato il cambiamento di temperatura; si consiglia di mantenere la soglia di attenzione alta e continuare a monitorare il proprio oliveto. Agli olivicoltori che intendono raccogliere nella seconda metà di ottobre, si consiglia di continuare con la strategia di difesa. Laddove si riscontra la presenza di adulti,

si consiglia di proseguire con i trattamenti per il contenimento attraverso **esche attivate con Spinosad** (max 8 trattamenti/anno).

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Pro v.	Comune	29 ^a sett.	30 ^a sett.	31 ^a sett.	32 ^a sett.	33 ^a sett.	34 ^a sett.	35 ^a sett.	36 ^a sett.	37 ^a sett.	38 ^a sett.	39 ^a sett.	40 ^a sett.
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Gemona	3f + 10m	2 f + 4 m	0	0		1 m	0	0	1 m	0	0	5m+1f
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m	0	0	0	0	0	0	2m
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0	1 m	1 f	1 m	0	1	1	3m+1f
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m	0	6	7 m	27 m	15 m	15m	4m+3f
PN	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0	0	0	1 m	1	1 m	1m	4m
PN	Mont. Valc.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0	0	1 f	0	4 m	11 m	11m	3m+1f
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0	0	1 m	1 m	0	0	0	3m+1f
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f	0	0	1 m	0	2 m	2m	15 m
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	0	0	2 m	5 m	0	0	0	1m+1f
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0	0	2 m + 1 f	0	1 m	1 m + 1f	1m+1 f	2m
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0	1	0	0	0	0	0	0
UD	Rive d'Arc.	0	2 m	1 f + 1 m	0	0	0	0	0	0	0	0	1m
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	1 m	0	0	1 m	0	0	0	0
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° catture mosca	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Foriscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITA' I e II età
UD	Cividale	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
UD	Majano	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
UD	Nespolo	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
UD	Gemona	6	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	4	2
UD	Nimis	7	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0
PN	Caneva	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PN	Polcenigo	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PN	S. Quirino	15	1	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	1	1
PN	Mont. V.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Rive D'Arc.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UD	Osoppo	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UD	Povoletto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	2	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
UD	Pozzuolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UD	Latisana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CASCOLA DELLE OLIVE

La cascola delle olive verdi a fine settembre, particolarmente evidente sulle piante più cariche, è un fenomeno legato a fattori fisiologici di autoregolazione, spesso aggravato da stress climatici o attacchi parassitari tardivi.

Se si osserva questo fenomeno nel proprio oliveto, si consiglia di prelevare un campione di 10 olive da terra ed esaminare attentamente la zona del picciolo per individuare la causa esatta:

- **Oliva intatta e completamente verde:** La causa è una **cascola fisiologica**. La pianta, non riuscendo a nutrire l'eccesso di frutti, produce acido abscissico (un ormone dello stress) che provoca il distacco naturale della drupa.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

- **Micro-foro millimetrico vicino al picciolo:** La caduta è dovuta all'attacco della **generazione carpofaga della Tignola dell'olivo**, avvenuto nel mese di giugno. La larva, dopo essersi nutrita della mandorla interna al nocciolo, esce perforando la zona di inserzione del peduncolo, recidendo i vasi linfatici e provocando la caduta immediata del frutto.

Sintesi:

Tipo di Cascola	Entità del danno / Soglia	Azione Consigliata
Fisiologica	Entro il 5% del carico totale.	Nessun allarmismo. Si tratta di un'autoregolazione naturale della pianta.
Da Tignola	Grave se oltre il 20% dei frutti a terra presenta il foro.	Non trattabile ora (la larva è già uscita). Segnare l'appezzamento per la prevenzione dell'anno successivo.

Qualora la cascola sulle piante sovraccariche diventi progressivamente più intensa, la strategia migliore per salvaguardare la produzione rimasta consiste nell'**anticipare la raccolta** non appena l'inoliazione dei frutti lo consenta.

In un'ottica di prevenzione per le stagioni future, si raccomanda di supportare le piante durante le fasi critiche estive impiegando **biostimolanti** a base di aminoacidi o alghe. In parallelo, è utile integrare trattamenti fogliari con **polveri di roccia (come il caolino)** per schermare la chioma dalle ondate di calore, prevenendo così lo shock termico che innesca il distacco della drupa.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSa 338-9385559