

Bollettino **Difesa Integrata** n° 07 del 09/07/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Permane il clima sereno con temperature più fresche nella giornata di sabato mattina è previsto un probabile temporale nel triestino mentre nel tardo pomeriggio di domenica anche nel goriziano.

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: Bianchera zona San Floriano del Collio



Foto: indurimento nocciolo Bianchera zona Muggia

Nell' areale di Muggia, Trieste

La varietà **Bianchera**: completo indurimento del nocciolo fase fenologica BBCH 77

La varietà **Leccino**: pre indurimento del nocciolo fase fenologica BBCH 75

Nell' areale di San Dorligo della Valle e goriziano

La varietà **Bianchera**: completo indurimento del nocciolo fase fenologica BBCH 77

La varietà **Leccino**: primo ingrossamento fase fenologica BBCH 71

Nell' areale carso

La varietà **Bianchera**: pre indurimento del nocciolo fase fenologica BBCH 75

La varietà **Leccino**: primo ingrossamento fase fenologica BBCH 71

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Le piogge di questi giorni e la riduzione delle temperature stanno favorendo lo sviluppo del fungo, seppur in maniera limitata viste le temperature oltre i 30 °.



Foto: Occhio di pavone

Difesa: Viste le temperature elevate si sconsiglia l' utilizzo di prodotti rameici per evitare fenomeni di fitotossicità.

Insetti:

- *Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)*

Si riscontra un ulteriore aumento della presenza della cimice marmorata asiatica in quasi tutti i comprensori, vengono rilevate ninfe di secondo e terzo stadio e nuove ovature. Le elevate temperature dei giorni scorsi hanno visto aumentare il bisogno di nutrimento dell' insetto per sopravvivere.



Foto: ninfa di cimice marmorata asiatica che si alimenta su un oliva e su tronco

In questa fase l' insetto tende a forare le olivine, i rami ed il tronco per nutrirsi, l' oliva appena punta inizia il processo di deperimento causando cascola, solitamente il primo attacco del fitofago avviene vicino a luoghi ove ha svernato quali case o ripari, per poi proseguire l' attività sulle piante limitrofe.

Il danno da cascola per la puntura avviene fino alla fase fenologica di indurimento del nocciolo dopodiché l' oliva viene danneggiata e si può deformare presentando suberificazioni interne, ma (se non in casi estremi) tende a non cadere.



Si ricorda che basta una sola ovatura di 28 esemplari per azzerare la produzione di olive sulla pianta.

PUNTI MONITORAGGIO		Catture settimana
Comune	Località	06 giu – 12 lug
GO	Ronchi dei Legionari	5 adulti + 44 neanidi
TS	Montecelo - San Dorligo della Valle	7 adulti + 2 neanidi
TS	Muggia	4 neanidi

Tabella: catture cimice marmorata asiatica

Difesa: Qualora risulti una cascola importante di olivine si consiglia di visionare bene le piante e se si rilevano diverse neanidi di cimice, intervenire con prodotto abbattente (piretro o deltametrina) per abbassare la popolazione.

- **Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)**

Le catture del lepidottero risultano in calo o sono nulle ovunque.

Difesa: non sono consigliati trattamenti

- **Margaronia (Palpita Unionalis)**

In questa settimana viene rilevata la presenza del lepidottero in alcuni areali



Foto: Margaronia

Difesa: non sono consigliati interventi

- **Mosca dell' olivo (Bactrocera Oleae)**

Dai rilievi settimanali viene segnalata la presenza del dittero in 4 località (vedi tabella)

Si ricorda che il limite termico per l'adulto al di sopra del quali risulta inattivo è dai 35°C in su, mentre con temperature da 30°C e con poche o nulle precipitazioni, l' insetto rallenta le ovideposizioni mentre la mortalità larvale e delle uova aumenta progressivamente man mano che le temperature superano i 30°C, gli altri stadi larvali essendo più all' interno della drupa iniziano a soccombere con temperature superiori i 35°C.



Difesa: vista la fase fenologica di indurimento del nocciolo per la varietà Bianchera/Ascolana nella zona di Muggia/Trieste e di pre indurimento del nocciolo in quasi tutte le altre località monitorate, incomincia la sensibilità delle drupe più soggette all' attacco della mosca olearia.

Attualmente non si rilevano punture del dittero, ma visto le temperature più miti e l' aumento dell' umidità nel fine settimana si svilupperanno le condizioni ideali per le prime ovideposizioni.

In prevenzione per chi non avesse optato per l' installazione delle trappole di cattura massale è consigliato l' uso dell' esca adulticida a base spinosad dove si sono rilevate le prime catture del dittero (vedi tabella).

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	3
GO	Ronchi	Selz	3
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	2
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0
TS	San Dorligo	Montedoro	0
TS	San Dorligo	Caresana	0
TS	Muggia	Aquilinia	0
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	1

Tabella: catture Bactrocera Oleae

Gestione agronomica

In caso di forte stress idrico su piante giovani, è consigliata l'irrigazione di soccorso, una buona pratica agronomica al fine di ridurre le bagnature e preservare il suolo, risulta essere la pacciamatura attorno le giovani piante con materiale vegetale come ad esempio la paglia che oltre ad ostacolare la crescita di infestanti contribuirà dopo decomposta ad arricchire il terreno.

Ingiallimento fogliare

Viene riscontrato, in tutti gli areali osservati, un aumento della presenza di foglie gialle soprattutto su varietà come Leccino, dovuto a un ricambio normale delle foglie, infatti questa varietà non essendo sensibile a malattie funginee, preserva le sue foglie (durata media 3 anni), in casi con forti ondate di calore, per agevolare la resistenza allo stress, la pianta priva della linfa e delle sostanze nutritive le foglie basali cioè quelle più vecchie ed ombreggiate.



Foto: Leccino con ingiallimento fogliare

Questo fenomeno, da non confondersi con la patologia funginea Occhio di Pavone la quale presenta delle macchie circolari sulla foglia o dalla carenza idrica che presenta decolorazione di tutta la chioma, viene limitato molto dove sono stati eseguiti trattamenti con le polveri di roccia/caolino/bentonite/talco/zeolite.



Foto: carenza idrica Leccio del Corno 2024 Sagrado



Foto: Occhio di pavone

Servizio tecnico Tergeste Dop: Copetti 3382006129 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersas: Gori 3389385559