

Bollettino **Difesa Biologica** n° 12 del 13/08/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Clima sereno con lieve bora nel triestino, temperature in leggero ribasso, nel goriziano permangono temperature elevate.

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: Bianchera zona Aquilinia



Foto: Maurino zona Aquilinia

In tutti gli areali

La varietà **Bianchera**: secondo accrescimento del frutto fase fenologica BBCH 78

La varietà **Leccino**: secondo accrescimento del frutto fase fenologica BBCH 78

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Le temperature elevate e l'assenza di precipitazioni prolungate rallenta molto la crescita funginea.



Foto: Occhio di pavone

Difesa: viste le temperature superiori ai 30°C è sconsigliato l'intervento con rameici.

Insetti:

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Catture in forte calo, si rilevano solo esemplari giovani sia nelle trappole di monitoraggio che sulle piante.

Difesa: Non sono consigliati interventi.



Foto: neanide di cimice marmorata asiatica

- **Margaronia (Palpita Unionalis)**

Dal monitoraggio in campo viene rilevato un lieve aumento della sua presenza nel goriziano e nel triestino con presenza di rosure sulle olive e sugli apici fogliari.



Foto: olive danneggiate da margaronia

Difesa: viste le esigue catture riscontrate non sono consigliati interventi

- **Mosca dell' olivo (Bactrocera Oleae)**

Le temperature elevate stanno ostacolando l' attività dell' insetto, non vengono rilevati stadi larvali attivi e nemmeno nuove ovideposizioni, le catture dell' esemplare adulto risultano molto basse in tutte le zone controllate (vedi tabella).

Difesa: si consiglia l' intervento con prodotti aducltici per ridurre ulteriormente la popolazione dacica.

Se si optasse per la strategia repellente è consigliato l' utilizzo di caolino/zeolite/bentonite/talco assieme a un adesivante/bagnante, questo creerà un ambiente sfavorevole all' ovideposizione della mosca olearia



Foto: mosca dell' olivo

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	0
GO	Ronchi	Selz	3
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	1
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0
TS	San Dorligo	Montedoro	1
TS	San Dorligo	Caresana	1
TS	Muggia	Aquilinia	3
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	1

Tabella: catture Bactrocera Oleae

Prov.	Comune	Località	Punture sterili										Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
			Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte						
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
GO	Sagrado	Sagrado	4	0	0	3	0	2	0	1	0	0	3	0	4	4	5
GO	Ronchi	Selz	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	2	0	2	2	5
TS	Duino Aurisina	Sgonico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TS	San Dorligo	Montedoro	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	4
TS	San Dorligo	Caresana	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	2	0	2	2	4
TS	Muggia	Aquilinia	3	0	0	5	0	4	0	1	0	1	6	0	8	8	9
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	3	0	0	3	0	1	0	1	0	0	7	0	8	8	4

Tabella: infestazione

Gestione Agronomica

Stress Idrico

In questo periodo, con lunghe esposizioni a temperature elevate e con carenza idrica le piante riducono, fino ad azzerare, di giorno la loro attività fotosintetica e di crescita dei frutti per evitare l'evapotraspirazione dai tessuti, i primi sintomi sono perdita di colorazione e di consistenza delle foglie, successivamente si avrà il raggrinzimento del frutto, nei casi più gravi perdita del frutto e deperimento della pianta.

I fattori che influenzano i sintomi di stress idrico sono molteplici:

- la granulometria del terreno, in quanto influenza molto la capacità di trattenere l'acqua, (terreni argillosi)
- la presenza di sostanza organica, la quale tende a formare una specie di “maglia” che trattiene l'acqua e modifica la struttura del terreno sfavorendo l'evapotraspirazione
- la varietà di olivo, cultivar come Maurino o Leccio del Corno hanno un apparato radicale poco sviluppato e faticano a assorbire l'acqua più in profondità
- il sesto d' impianto




Foto: maurino zona Muggia



Foto : Frantoio zona Farra d' isonzo su terreno ghiaioso

Consigli: l' utilizzo di polveri di roccia come il caolino risulta essere un buon aiuto per difendere

la pianta dagli eccessi di calore o alla carenza idrica.

Potatura verde

In questo mese si consiglia di iniziare le operazioni di potatura verde rimuovendo tutti i polloni basali ed eliminando l' eccesso di succhioni interni o mal posizionati.



Foto: succhioni



Foto: polloni

Questa operazione oltre ad un risparmio di risorse per la pianta è importante soprattutto su olivi riformati l' annata precedente dove lo scoppio vegetativo spesso risulta importante ed agevolerà molto la potatura invernale.



consorzio olio – konzorcij olja
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

Servizio tecnico Ersas: Gori 3389385559

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale