

Bollettino **Difesa Integrata** n° 14 del 27/08/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Sono previste lievi velature con clima sereno e temperature costanti, assenza di vento.

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: inizio invaiatura Leccino Ronchi



Foto: Bianchera zona Caresana

In tutti gli areali

La varietà **Bianchera**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

La varietà **Leccino**: Inizio invaiatura fase fenologica BBCH 81

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Incominciano a crearsi le condizioni favorevoli per la proliferazione funginea, l'unico fattore attualmente limitante sono le temperature, le quali devono essere entro i 18° C.



Foto: Occhio di pavone

Difesa: nelle zone con forte umidità, con elevate bagnature, con temperature favorevoli o con infezioni latenti, si consiglia l'intervento con prodotti rameici, come ad esempio la poltiglia bordolese che offre un'azione preventiva ed efficace in zone umide.

Insetti:

- *Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)*

Sulle piante continuano ad essere osservate varie presenze dell' insetto anche a più stadi di sviluppo.

Difesa: Non sono consigliati interventi.



Foto: adulto di cimice marmorata asiatica

- *Margaronia (Palpita Unionalis)*

Dal monitoraggio in campo continuano a venir rilevati i danni causati dall' insetto sia nel goriziano che nel triestino con presenza di rosure sulle olive e sugli apici fogliari, nelle trappole di monitoraggio vi è un incremento delle catture di esemplari adulti.



Foto: olive danneggiate da margaronia

Difesa: In casi di media/forte infestazione si consiglia di intervenire preventivamente con *Bacillus Thuringensis* per abbassare la presenza del lepidottero ripetendo dopo 10 giorni il medesimo trattamento, questi interventi dovranno essere eseguiti verso tardo pomeriggio per evitare che risultino inefficaci in quanto il prodotto ha poca durata e l' insetto agisce prevalentemente di notte.

- **Mosca dell' olivo (*Bactrocera Oleae*)**

Vengono rilevati in campo diverse punture sulle drupe, soprattutto nelle zone dove non sono stati effettuati interventi adalticidi e che presentano molti esemplari di mosca nelle trappole di monitoraggio.



Foto: Puntura di ovideposizione della Mosca olearia

Difesa: si consiglia l' intervento con prodotti adalticidi per ridurre ulteriormente la popolazione dacica. L' Utilizzo di polveri di roccia con adesivanti/bagnanti, in queste ultime fasi, permetterà di ostacolare lo sviluppo dell' insetto arrivando alla raccolta con poca o nulla infestazione dannosa.

In casi di infestazione oltre soglia si consiglia l' intervento larvicida con prodotti a base Acetamiprid (max 2 interventi/anno) o Flupyradifurone (max 1 intervento/anno).

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	0
GO	Ronchi	Selz	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	0
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0
TS	San Dorligo	Montedoro	0
TS	San Dorligo	Caresana	4
TS	Muggia	Aquilinia	8
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	3

Tabella: catture *Bactrocera Oleae*

Servizio tecnico Tergeste Dop: Copetti 3382006129 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersa: Gori 3389385559