

Bollettino **Difesa Integrata** n° 16 del 10/09/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Deboli piogge residue nella mattinata di venerdì con temperature in ribasso ed umidità elevata

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: Bianchera Sgonico



Foto: Invaiaura Leccino zona Muggia

In tutti gli areali

La varietà **Bianchera**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

La varietà **Leccino**: Inizio invaiatura fase fenologica BBCH 81

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Condizioni idonee allo sviluppo fungineo dalla prossima settimana verrà eseguito il campionamento fogliare per stabilire l' intensità e l' infezione del patogeno.



Foto: Occhio di pavone

Difesa: valutare l' intervento anche in base ai tempi di carenza dei prodotti cuprici (solitamente 28 giorni) e la previsione di raccolta su varietà precoci

Insetti:

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Grosso aumento delle catture dell' insetto in tutte le locations di monitoraggio, vengono riscontrate molte neanidi e parecchi esemplari adulti, attualmente l' insetto se trova nella sua ultima fase evolutiva prima dello svernamento.

Difesa: Non sono consigliati interventi.



Foto: adulto di cimice marmorata asiatica

- **Margaronia (*Palpita Unionalis*)**

Si rilevano parecchie catture del lepidottero nel goriziano e alcune nel muggesano



Foto: olive danneggiate da margaronia



Foto: insetto adulto

Difesa: In casi di media/forte infestazione si consiglia di intervenire preventivamente con *Bacillus Thuringensis* per abbassare la presenza del lepidottero ripetendo dopo 10 giorni il medesimo trattamento, questi interventi dovranno essere eseguiti verso tardo pomeriggio per evitare che risultino inefficaci in quanto il prodotto ha poca durata e l' insetto agisce prevalentemente di notte.

- **Mosca dell' olivo (*Bactrocera Oleae*)**

Continuano i rilievi in campo dove si osservano in alcune zone diverse punture sulle drupe.

Dal campionamento per verificare l' infestazione attiva in alcune zone sono state rilevate larve di prima e seconda età.



Foto: Puntura di ovideposizione della Mosca olearia

Difesa: si consiglia l' intervento con prodotti adulticidi per ridurre ulteriormente la popolazione dacica dopo le piogge. In caso d' infestazione oltre soglia è ancora possibile intervenire con prodotti larvicidi quali Acetamiprid (max 2 volte anno) o Flupyradifurone (max 1 volta anno), prestare attenzione ai tempi di carena dei prodotti.

consorzio olio – konzorcij olja
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	0
GO	Ronchi	Selz	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	0
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0
TS	San Dorligo	Montedoro	1
TS	San Dorligo	Caresana	4
TS	Muggia	Aquilinia	2
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	0

Tabella: catture Bactrocera Oleae

Prov.	Comune	Località	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1
GO	Sagrado	Sagrado	4	0	1	2	1	0	0	2	0	2
GO	Ronchi	Selz	3	0	1	3	0	0	1	1	1	2
TS	Duino Aurisina	Sgonico	1	0	1	0	1	0	1	2	1	3
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montedoro	4	0	1	2	0	0	1	1	1	2
TS	San Dorligo	Caresana	3	0	1	1	0	0	1	1	1	2
TS	Muggia	Aquilinia	2	0	0	7	0	2	4	0	4	4
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	2	1	2	1	1	1	2	4	2	6

Tabella: infestazione Bactrocera Oleae

Servizio tecnico Tergeste Dop: Copetti 3382006129 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersa: Gori 3389385559