

Bollettino **Difesa integrata** n° 17 del 17/09/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Deboli piogge residue nella giornata di domani poi cielo sereno e poco nuvoloso nel weekend.

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: Invaiaura Leccino zona Montecelo

In tutti gli areali

La varietà **Bianchera**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

La varietà **Leccino**: invaiatura fase fenologica BBCH 81

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Condizioni idonee allo sviluppo fungineo in tutte le zone si nota la riattivazione del micelio latente (Vedi Tabella)



Foto: Occhio di pavone

Difesa: valutare l' intervento anche in base ai tempi di carenza dei prodotti cuprici (solitamente 28 giorni) e la previsione di raccolta su varietà precoci

Cultivar Bianchera

Provincia	Comune	Località	N° Foglie infette	Infezione %
GO	San Floriano	Valerisce	9	4,00
GO	Sagrado	Sagrado	3	1,00
GO	Ronchi	Selz	6	2,67
TS	Sgonico	Sgonico	22	9,67
TS	San Dorligo	Montedoro	9	4,00
TS	San Dorligo	Montecelo sud	5	2,00
TS	San Dorligo	Montecelo nord	12	5,67
TS	San Dorligo	Caresana	6	2,33
TS	Muggia	Aquilinia	0	0,00
TS	Muggia	Darsella	6	2,00

Tabella: infestazione Cicloconio

Insetti:

- *Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)*

proseguono le catture dell' insetto in tutte le locations di monitoraggio, vengono riscontrati molti esemplari adulti, attualmente l' insetto si trova nella sua ultima fase evolutiva prima dello svernamento.

Difesa: Non sono consigliati interventi.



Foto: neanide di cimice marmorata asiatica

- **Margaronia (Palpita Unionalis)**

Si rilevano parecchie catture del lepidottero nel goriziano e alcune nel muggesano



Foto: olive danneggiate da margaronia



Foto: Larva di margaronia



Foto : insetto adulto

Difesa: In casi di media/forte infestazione si consiglia di intervenire preventivamente con *Bacillus Thuringensis* per abbassare la presenza del lepidottero ripetendo dopo 10 giorni il medesimo trattamento, questi interventi dovranno essere eseguiti verso tardo pomeriggio per evitare che risultino inefficaci in quanto il prodotto ha poca durata e l' insetto agisce prevalentemente di notte.

• **Mosca dell' olivo (*Bactrocera Oleae*)**

Continuano i rilievi in campo dove si osservano in alcune zone diverse punture sulle drupe, dalle trappole di monitoraggio risulta un aumento della presenza del dittero con probabile picco di sfarfallamento nella zona di Caresana.

Dal campionamento delle olive per verificare l' infestazione attiva in alcune zone sono state rilevate larve di prima, seconda e terza età.



Foto: catture di Mosca olearia zona Caresana

Difesa: si consiglia l' intervento con prodotti adulticidi per ridurre ulteriormente la popolazione dacica dopo le piogge. In caso di forte pressione dell' insetto si consiglia di prepararsi alla raccolta anticipata. In caso di raccolta tardiva è possibile ancora utilizzare larvicidi quali Acetamiprid (max 2 volte/anno) o Flupyradifurone (max 1 volta/anno)

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	0
GO	Ronchi	Selz	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	0
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	1
TS	San Dorligo	Montedoro	6
TS	San Dorligo	Caresana	23
TS	Muggia	Aquilinia	8
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	2

Tabella: catture *Bactrocera Oleae*

- **Tignola dell' olivo (*Prays oleae*)**

In questi giorni sta sfarfallando la Tignola dell' olivo, in alcune località viene rilevata la cascola delle olive, il lepidottero fuoriuscendo dal nocciolo dell' oliva provoca un danno alla tenuta del peduncolo che trattiene l' oliva, al taglio per verificare l' effettiva cascola si osserva il foro di uscita.



Foto: foro di uscita della Tignola dell' olivo e interno del nocciolo

Gestione agronomica

Si consiglia di effettuare la preparazione del terreno con lo sfalcio delle erbe infestanti quali rovi e sterpi come misura preparatoria alla raccolta , inoltre è opportuno verificare le condizioni delle reti e delle cassette forate.

Raccolta

Si consiglia di contattare il frantoio per pianificare la molitura soprattutto se si vuole effettuare una raccolta precoce.



Foto: Estrattore centrifugo serie SPI

Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe

REMANZACCO – Frantoio Chiaradini – Via Scrosoppi 47; tel. 349 4590570

MARTIGNACCO – Consorzio Produttori Olio Extravergine F.V.G. – Via Malignani, 26; tel. 327 657 4870

CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912

RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 206994

CASTIONS DI STRADA - Corte Tomasin -Vicolo Levada,7; tel. 3335208940

TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111

TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 - 040 8326364

DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053

FRANTOIO Lisjak,–Slovenia Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenia t: +386 40 294 248/+386 31 893 378

FRANTOIO Bizjak –Slovenia Osp 77, 6275 Črni Kal, Slovenia t +386 41607543

CAPPELLA MAGGIORE (Tv) – Coop. REITIA-Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; c.3774143149

Servizio tecnico Tergeste Dop: Copetti 3382006129 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersas: Gori 3389385559