



AVVERTIMENTO VITICOLO N. 2 del 19/03/2013

CONSIGLI PER IL DISERBO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Disciplinare di Produzione Integrata delle colture 2012 – 2013 "Norme tecniche per il controllo delle infestanti"

Il diserbo primaverile del sottofilare si realizza attraverso diverse strategie che prevedono, in presenza di infestanti, l'utilizzo di prodotti ad azione fogliare quali:

- **Glifosate (30,4% s.a.):** *indipendentemente dall'utilizzo il quantitativo massimo annuo ammesso è di 9 L/Ha.*

Oppure nel caso di infestanti quali graminacee e dicotiledoni ai primi stadi di sviluppo prodotti ad azione residuale e anti-germinello:

- ✓ **Oxifluorfen (22,9% s.a.) :** *da utilizzare a dosi ridotte (0,3 L - 0,45 L per intervento) in miscela con altri prodotti sistemici. Dose anno massima ammessa 1 L/Ha.*
- ✓ **Flazasulfuron (25% s.a.):** *da utilizzarsi in miscela con il glifosate, nel periodo di fine inverno – inizio primavera ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. Dose anno massima 0,07 Kg/Ha*
- ✓ **Pyraflufen-ethyl (2,5% s.a.):** *impiegabile alla dose di 0,8 l/ha per trattamento con un limite massimo di 1,6 l/ha all'anno.*
- ✓ **Carfentrazone etile (6,45% s.a.):** *utilizzabile anche per il controllo dei polloni. Indipendentemente dall'utilizzo il quantitativo massimo annuo ammesso è di 1 L/Ha*
- ✓ **Ciclossidim (10,9% s.a.) - Isoxaben (45,5% s.a.) - Pendimetalin (38,72% s.a.):** *solo nei primi 2 anni di allevamento e localizzati sulla fila con una dose massima di 2 l/ha.*

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recapiti telefonici : |
| Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010 |
| Studio Agrifides – Fides s.r.l. (Consulenze specialistiche in viticoltura ed enologia www.agrifides.com) |
| Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516 |