

AVVERTIMENTO VITICOLO N° 13 DEL 10 LUGLIO 2013

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Ultima settimana all'insegna del tempo sostanzialmente stabile, ad eccezione di qualche locale piovasco nelle giornate di venerdì - sabato scorsi. Per i prossimi giorni prevalenza di bel tempo, anche se non si possono escludere – anche in pianura – precipitazioni sparse con carattere temporalesco.

FENOLOGIA

Le varietà a grappolo compatto come Pinot e Chardonnay hanno completato la fase di chiusura (BBCH 79); si presume che tra 7-10 giorni, sulle cultivar precoci nei vigneti della bassa pianura, si possano osservare i primi acini invaiati.

DIFESA

In alcuni casi, sulla nuova vegetazione, si osservano sporadiche macchie di peronospora, anche con buona sporificazione; sui grappoli che avevano già avuto attacchi durante la fase di fioritura-allegagione si riscontrano le prime infezioni di peronospora larvata (foto 1). In aumento i focolai di oidio a carico dei grappoli, in modo particolare dove erano già state rilevate infezioni. A livello di curiosità (e speriamo che resti tale) sono stati visti i primi acini di Pinot grigio con botrite (foto 2); gli acini erano ben pressati all'interno del grappolo e presentavano delle micro ferite che hanno permesso l'insediamento del patogeno. Sulla base dello sviluppo fenologico della vite e dell'andamento climatico si consiglia di intervenire

Mercoledì 10 - Giovedì 11 luglio

Peronospora: prodotti a base di **rame** (ossicloruro, idrossido, poltiglia bordolese).

Oidio: prodotti a base di **zolfo bagnabile micronizzato** (a dose medio - alta di etichetta).



Foto 1: larvata su grappolo di Merlot (08.07.2013)



Foto 2: primi sintomi di botrite su acini di Pinot grigio (08.07.2013)

CURE ALLA VEGETAZIONE

E' importante procedere con le operazioni di gestione del verde (cimature, sfogliature – facendo comunque attenzione, in questo periodo, a non esporre eccessivamente la fascia dei grappoli sul lato del filare più esposto all'irraggiamento); tali interventi migliorano la qualità dei trattamenti anticrittogamici, permettendo una miglior penetrazione degli stessi.

TIGNOLE DELLA VITE

In quasi tutti i siti monitorati (eccezion fatta per alcune zone dell'alta pianura) è in fase di esaurimento il volo della seconda generazione delle tignole della vite (la popolazione predominante è stata l'*Eupoecilia ambiguella* o Tignola della vite). In tabella 1 vengono riportate le date medie di inizio e del picco dei voli.

Zona	Inizio voli	Picco volo
Alta Pianura	20-25 giugno	27 giugno-1° luglio
Bassa Pianura	17-20 giugno	20-27 giugno

Tab. 1 Date medie di inizio e picco del volo di *Eupoecilia ambiguella*.

[Si ricorda che gli avvertimenti viticoli, per quanto riguarda le varie strategie di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e le norme tecniche agronomiche, seguiranno gli indirizzi tecnici del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.](#)