

## AVVERTIMENTO VITICOLO N°4 DEL 30 APRILE 2013

### ANDAMENTO METEOROLOGICO

Dopo la depressione che ha interessato il comprensorio nei giorni scorsi, correnti umide continueranno ad affluire anche nei prossimi giorni, con probabili piogge (da moderate a localmente abbondanti) attese nella giornata di giovedì 02 maggio.

### FENOLOGIA

Le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo vegetativo della vite: infatti, in meno di una settimana, c'è stato per tutte le varietà un deciso accrescimento dei germogli ed un incremento medio di circa 3 foglie/germoglio.

In tabella 1 vengono riportati i valori medi di fenologia e la lunghezza massima raggiunta dai germogli di alcune varietà, monitorati in data 29 aprile.

VARIETA'	SCALA BBCH	Lunghezza max. germogli (cm)
<i>Pinot grigio(alta pianura)</i>	13-14/53	12-15
<i>Pinot grigio(medio-bassa pianura)</i>	14-15/53	15-18
<i>Chardonnay</i>	14-16/53	18-20
<i>Refosco p.r.</i>	15-16/53	> 20
<i>Cabernet sauv.</i>	11-13	< 10
<i>Glera.</i>	16/53-55	> 20

Tab. 1: sviluppo fenologico di alcune cultivar presenti nel comprensorio e lunghezza massima dei germogli

**BBCH 1n:** n foglie spiegate; **BBCH 53:** infiorescenza chiaramente visibile, **BBCH 55:** rigonfiamento dell'infiorescenza;



Foto 1: BBCH 55 (rigonfiamento dell'infiorescenza)

#### **Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave**

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)

Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621

C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933

docgrave@docfriuligrave.com - www.docfriuligrave.com

## DIFESA

Sulla base dello sviluppo fenologico della vite e dell'andamento climatico si consiglia di intervenire su tutte le varietà, appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, e comunque

**entro Venerdì 03 maggio**

con prodotti di copertura a base di **ditiocarbammati** come Mancozeb<sup>°</sup>, Metiram, Propineb (da preferire in vigneti con presenza di escoriosi - foto 2) oppure **Dithianon** che garantisce una elevata resistenza al dilavamento. Utilizzare prodotti a base di **rame** (idrossido, ossicloruro, ecc.) nei vigneti a conduzione biologica.

In chiave antioidica impiegare **zolfo bagnabile** a dosaggi medi, oppure preferire prodotti a base di **Meptildinocap**<sup>°°</sup> nei vigneti dove l'anno scorso si erano riscontrati importanti focolai di oidio.

<sup>°</sup> al massimo 3 interventi/anno indipendentemente dall'avversità.

<sup>°°</sup> al massimo 2 interventi/anno.



Foto 2: sintomi di escoriosi su asse del germoglio e picciolo fogliare (29.04.2013)

## TIGNOLE DELLA VITE

In tabella 2 si riporta la data di inizio del I volo delle tignole della vite (*Eupoecilia a.*, *Lobesia b.*) nei siti di monitoraggio.

LOCALITA'	DATA	
	Eupoecilia a.	Lobesia b.
Spilimbergo (loc. Provesano)	15-18/04	08-11/04
Pinzano al T.	23-26/04	26-29/04
Rive d'Arcano	23-26/04	---
Mereto di Tomba	23-26/04	23-26/04
Codroipo	26-29/04	26-29/04
Pavia di Udine	23-26/04	---
Gonars	23-26/04	23-26/04
Bertiolo	18-23/04	---
Camino al T.	18-23/04	18-23/04
San Vito al T.	22-29/04	22-29/04
San Giorgio della Richinvelda	22-29/04	18-22/04
Spilimbergo (loc. Tauriano)	18-22/04	18-22/04
Sequals	18-22/04	18-22/04
Porcia	22-29/04	18-22/04

Tab. 2: inizio dei voli di I generazione delle tignole della vite.

[Si ricorda che gli avvertimenti viticoli, per quanto riguarda le varie strategie di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e le norme tecniche agronomiche, seguiranno gli indirizzi tecnici del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia](#)