

AVVERTIMENTO VITICOLO N° 7 DEL 21 MAGGIO 2013

ANDAMENTO METEOROLOGICO

I giorni scorsi sono stati caratterizzati ancora da piogge intense (in tab. 1 vengono riportati i valori delle precipitazioni), a volte accompagnate anche da fenomeni grandinigeni. Per i prossimi giorni correnti instabili interesseranno nuovamente la regione a partire dal pomeriggio-sera di giovedì, con deciso peggioramento (e brusco calo termico) atteso per la giornata di sabato 25 maggio.

Località/Data	Precipitazioni (mm)				
	16-mag	17-mag	18-mag	19-mag	20-mag
Brugnera	65,2	22,1	0,2	13,6	3,5
Buttrio	34,8	37,2	0,2	9,2	7,6
Codroipo	48,4	24,2	0,1	12,8	8,6
Fagagna	34,8	29,4	0,1	14,7	6,4
San Vito T.	63,1	21,2	0,2	16,9	0,5
Talmassons	39,7	19,9	0,2	13,0	1,4
Casarsa	60,2	32,2	0,6	17,2	7,6
Vivaro	58,7	25,6	0,1	17,0	12,0

Tab. 1: piogge registrate in alcune località della Doc Friuli Grave.

FENOLOGIA

Dai monitoraggi effettuati in data 20 maggio, le varietà precoci presentano mediamente lo stadio fenologico di bottoni fiorali separati (BBCH 57), fase che normalmente precede di circa una settimana l'inizio della fioritura.

DIFESA

Le frequenti piogge e le prolungate bagnature fogliari sono estremamente favorevoli allo sviluppo di infezioni peronosporiche; a conferma si è osservato una recrudescenza dell'ampelopatia a carico del lembo fogliare (foto 1 e 2), sia sui vigneti testimone (non trattati) che sui vigneti normalmente trattati. Al momento non sono state riscontrate infezioni su grappolo.

Sulla base dello sviluppo fenologico della vite e dell'andamento climatico si consiglia di intervenire

Mercoledì 22 maggio

con prodotti a base di *Metalaxil** o *Metalaxil-M** o *Benalxil** o *Benalxil-M** o *Fluopicolide*** + partner di copertura (*Mancozeb**** o *Metiram* o *Dithianon*) + *Fosetil di alluminio* (come coformulato o in miscela estemporanea). In chiave antioidica impiegare prodotti a base di *Spiroxamina*^o o *Metrafenone*^o o *IBE*^{oo} (questi ultimi consigliati in particolar modo in vigneti con forte rischio di infezioni di Black-rot).

N.B. E' preferibile non miscelare il Fosetil di alluminio con prodotti rameici, oli, concimi fogliari. Nei vigneti a conduzione biologica utilizzare prodotti a base di **rame** (idrossido, ossicloruro, ecc.) e **zolfo bagnabile** alle dosi massime di etichetta, avendo cura di rientrare dopo piogge dilavanti.

Si raccomanda di trattare su vegetazione asciutta; inoltre sono necessarie almeno 2-3 ore per il completo assorbimento dei principi attivi ad azione endoterapica-sistemica.

* al massimo 3 interventi/anno con fenilammidi.

** al massimo 3 interventi/anno.

*** al massimo 3 interventi/anno, indipendentemente dall'avversità.

^o al massimo 3 interventi/anno.

^{oo} al massimo 3 interventi/anno, indipendentemente dall'avversità. Non ammesse formulazioni Xn.

Si ricorda che i ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram) non vanno impiegati oltre la fase dell'allegagione.



Foto 1: tipica macchia d'olio su pagina superiore (20.05.2013)



Foto 2: sporificazione su pagina inferiore (20.05.2013)

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)

Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621

C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933

docgrava@docfriuligrave.com - www.docfriuligrave.com

VARIE

Tignole della vite: in quasi tutti i siti monitorati è terminato il volo della I generazione delle tignole della vite.

Scaphoideus titanus: in alcune località, in data 09-10 maggio, sono stati osservati i primi stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*, cicalina responsabile della trasmissione del fitoplasma della Flavescenza dorata; nei prossimi avvertimenti verranno date informazioni in merito al trattamento obbligatorio.

A livello regionale è in fase di attuazione un monitoraggio riguardante piante con sintomi (foto 3 e 4) che inizialmente possono essere confusi con una grave forma di acariosi, ma che successivamente non sono più visibili sulla nuova vegetazione; un elemento discriminante per l'identificazione è l'assenza dei grappoli sul germoglio. La sintomatologia è soprattutto presente su cultivar come Pinot grigio, Tocai F., Traminer a. e a volte Glera: di tale quadro patologico rimane incerta l'eziologia. I viticoltori sono invitati a contrassegnare le piante sintomatiche e a contattare i tecnici del Consorzio DOC Friuli Grave per un sopralluogo (0434/646538 – 338/2024046).



Foto 3: pianta sintomatica - si noti l'assenza di grappoli – (20.05.2013)



Foto 4: particolare dei sintomi su foglia di Glera (20.05.2013)

[Si ricorda che gli avvertimenti viticoli, per quanto riguarda le varie strategie di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e le norme tecniche agronomiche, seguiranno gli indirizzi tecnici del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.](#)

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)

Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621

C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933

docgrave@docfriuligrave.com – www.docfriuligrave.com