

AVVERTIMENTO VITICOLO N° 11 DEL 24 GIUGNO 2013

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Ultima settimana caratterizzata da bel tempo e caldo; nella serata tra domenica 23 e lunedì 24 giugno un fronte atlantico ha favorito un repentino peggioramento, con temporali diffusi ed abbassamento termico. Prossimi giorni all'insegna della variabilità, con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiano-serali; temperature massime comprese tra i 22-25 °C.

FENOLOGIA

In tabella 1 vengono riportati i valori rilevati giovedì 20 giugno, e riferiti alla fenologia media di alcuni vitigni presenti nel comprensorio della DOC Friuli Grave.

VARIETA'	SCALA BBCH
<i>Pinot grigio (alta pianura)</i>	73
<i>Pinot grigio (medio-bassa pianura)</i>	74-75
<i>Chardonnay (medio-bassa pianura)</i>	74-75
<i>Refosco p.r. (medio-bassa pianura)</i>	73-74
<i>Cabernet s. (medio-bassa pianura)</i>	70-72
<i>Glera (medio-bassa pianura)</i>	73-74

Tab. 1: fenologia di alcune varietà osservata in data 20.06.2013.

BBCH 70: tutte le caliptré sono cadute; **BBCH 71:** comparsa dei giovani frutti; **BBCH 72:** bacche più piccole di un grano di pepe; **BBCH 73:** grano di pepe; **BBCH 74:** tra grano di pepe e pisello; **BBCH 75:** bacche con dimensioni di un pisello (foto 1).



Foto 1: Pinot grigio BBCH 74-75 (20.06.2013)

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)
 Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621
 C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933
 docgrave@docfriuligrave.com - www.docfriuligrave.com

DIFESA

Sulla base dello sviluppo fenologico della vite e dell'andamento climatico si consiglia di intervenire

Martedì 25 giugno

Peronospora: prodotti a base di **Zoxamide*** o **Cyazofamide*** (dalla fase dell'allegagione utilizzare il **rame** come eventuale partner di copertura).

Oidio: prodotti a base di **Boscalid°** o **Quinoxifen°°** (solamente con azione preventiva). In questa fase, può risultare efficace anche un trattamento con **zolfo in polvere** (20-25 Kg/ettaro).

Nei vigneti a conduzione biologica utilizzare prodotti a base di **rame** (idrossido, ossicloruro, ecc.) e **zolfo bagnabile** alle dosi massime di etichetta, avendo cura di rientrare dopo piogge dilavanti.

Botrite: l'utilizzo di principi attivi quali **Zoxamide*** e soprattutto **Boscalid°** presentano una buona efficacia nei confronti di questa patologia. Rimane di fondamentale importanza eseguire - prima del trattamento - le corrette operazioni di gestione del verde (sfogliatura, cimatura), in modo da permettere ai prodotti di raggiungere direttamente la fascia dei grappoli e garantire agli stessi un ottimale arieggiamento.

* *al massimo 3 interventi/anno.*

° *al massimo 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità;*

°° *al massimo 3 interventi/anno.*

TIGNOLE DELLA VITE

In gran parte dei siti monitorati nella medio-bassa pianura sono iniziati, tra lunedì 17 e giovedì 20 giugno, i voli della II generazione delle tignole della vite (in modo particolare di *Eupoecilia ambiguella*). Per chi in questa fase volesse effettuare un trattamento specifico - con p.a. regolatori di crescita - contro le larve di questa generazione può contattare i tecnici del Consorzio. Ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di prodotti ad azione abbattente, efficaci anche per il controllo di *Scaphoideus titanus*, verranno fornite nei prossimi avvertimenti.

Si ricorda che gli avvertimenti viticoli, per quanto riguarda le varie strategie di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e le norme tecniche agronomiche, seguiranno gli indirizzi tecnici del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.