

## SERVIZIO DI LOTTA GUIDATA E INTEGRATA IN VITICOLTURA AVVERTIMENTO N° 13 del 17/07/2012

**Dati piovosità** (mm pioggia)

n.d.: dato non disponibile

Località	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07	15/07	16/07
Dolegna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lonzano	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
Pradis Cormons	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Capriva	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
Lucinico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oslavia	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Gradisca Is.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aurisina(TS)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sgonico(TS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**PREVISIONI DEL TEMPO:** su tutta la regione cielo da sereno a poco nuvoloso; sarà possibile localmente maggiore nuvolosità con qualche isolato rovescio. Sulla costa soffierà Borino al mattino e la sera, brezza di pomeriggio. (Fonte Osmer: [www.meteo.fvg.it](http://www.meteo.fvg.it))

**FASE FENOLOGICA:** tutte le varietà presentano grappoli con acini che stanno raggiungendo le loro massime dimensioni.

**CURE ALLA VEGETAZIONE:** attenzione nelle operazioni di sfogliatura sulla fascia dei grappoli, in quanto forti sbalzi termici e giornate limpide e soleggiate, potrebbero provocare scottature (ustioni) ai grappoli esposti.

### PERONOSPORA

**Situazione:** si rilevano alcune macchie su giovani femminelle talvolta sporulanti (fresche), si raccomanda di controllare bene i vigneti.

**Consigli:** rinnovare la protezione della vegetazione intervenendo **giovedì 18 luglio** utilizzando prodotti ad azione di contatto a base di **Rame (Idrossidi, Ossicloruri e Poltiglia bordolese)** alle dosi massime di etichetta.

Chi escludesse l'utilizzo di prodotti rameici può intervenire con **Cyazofamid** alla dose massima riportata in etichetta. Non applicare su vegetazione infetta da peronospora.

### OIDIO

**Situazione:** si segnala in alcuni vigneti un'importante presenza del fungo soprattutto su Chardonnay e Pinot grigio; per tale motivo si raccomanda un attento controllo della vegetazione per rilevare i primi sintomi.

**Consigli:** nelle situazioni pulite abbinare all'antiperonosporico **Cyflufenamide, Quinoxifen, o zolfo bagnabile** alla dose di etichetta. Può risultare utile un intervento con **Zolfo in polvere** ad una dose di 20-25 kg/ha.

**In presenza di focolai del fungo contattare il tecnico.**

### TIGNOLE

**Situazione:** prosegue il monitoraggio del volo della 2<sup>a</sup> generazione.

**Consigli:** la strategia di lotta già proposta ha previsto l'utilizzo dell'insetticida fosfororganico **Clorpirifos** efficace contro le tignole (**vedere specifico avvert. n°11**).

## **FLAVESCENZA DORATA (FD)**

### **Lotta obbligatoria al vettore della malattia**

Il D.M. del 31/05/00 rende obbligatoria la lotta alla FD della vite ed al suo insetto vettore, lo *Scaphoideus titanus*.

Per tutta l'area viticola di pertinenza del Consorzio Collio e Carso vi è l'obbligo di un trattamento insetticida contro la cicalina vettore di FD. **(vedere specifico avvert. n°11).**

### **INFORMAZIONI UTILI**

Le sostanze attive e le limitazioni d'uso indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni riportate nelle **NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA EMANATE DALLA**

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** (delibera n. 981 approvata dalla Giunta Regionale il 7 giugno 2013).

Per chi segue il disciplinare regionale di difesa integrata, si ricorda che i **ditiocarbammati** (mancozeb e metiram), non sono impiegabili oltre l'allegazione.

**Cyazofamid** sono consentiti *3 interventi all'anno*.

**Quinoxifen:** sono consentiti *3 interventi all'anno*.

**Cyflufenamide** sono consentiti *2 interventi all'anno*.