



CONSORZIO TUTELA VINI DOC FRIULI ISONZO

SERVIZIO DI DIFESA INTEGRATA IN VITICOLTURA

AVVERTIMENTO N° 11 del 09/07/2013

SPECIALE TRATTAMENTO CONTRO *PLANOCOCCUS FICUS* e *PARTHENOLECANIUM CORNI*

Questo trattamento è rivolto solo ai vigneti con importanti infestazioni di *Planococcus ficus* e *Parthenolecanium corni*. L'intervento va valutato con i tecnici del Consorzio Isonzo.

Planococcus ficus

Situazione generale: in alcuni vigneti del comprensorio si è notata la migrazione di *Planococcus ficus*, con lo spostamento degli adulti da sotto il ritidoma verso la vegetazione (prime foglie basali).

Epoca d'intervento: effettuare il trattamento al momento della migrazione delle neanidi verso la vegetazione. L'intervento è consigliato da domani mercoledì 10 luglio.

Varietà sensibili: Pinot grigio e Chardonnay.

Prodotti e dosaggio

Impiegare prodotti a base di :

- Clorpirifos-etile (CPE) in formulazione EC (emulsione concentrata) alla dose massima da etichetta, con aggiunta di olio bianco estivo alla dose media da etichetta.
- Spirotetramat alla dose di 1,5L/Ha, da solo o in formulazione con olio minerale 0,25%.

Metodi ed indicazioni di utilizzo:

- Trattare nelle prime ore del mattino o la sera al tramonto, quando l'umidità relativa raggiunge valori maggiori del 60%.
- Direzione il prodotto su tutta la fascia tronco (dall'innesto in su).
- Bagnare abbondantemente.

Volume d'acqua da impiegare: come un trattamento antibiottrico, circa 300-400 litri/ettaro.

Parthenolecanium corni

Situazione generale: in alcuni vigneti del comprensorio si è notata la migrazione del *Parthenolecanium corni*, con lo spostamento delle neanidi dal capo a frutto verso la vegetazione ed i grappoli.

Epoca d'intervento: effettuare il trattamento al momento della migrazione delle neanidi verso la vegetazione. L'intervento è consigliato da domani mercoledì 10 luglio.



Varietà sensibili: Pinot grigio e Chardonnay.

Prodotti e dosaggio

Impiegare prodotti a base di:

- Thiamethoxam a dose da etichetta.

Metodi ed indicazioni di utilizzo:

- Trattare nelle prime ore del mattino o la sera al tramonto, quando l'umidità relativa raggiunge valori maggiori del 60%.
- Direzione il prodotto su tutta la fascia tronco (dall'innesto in su).
- Bagnare abbondantemente.

Volume d'acqua da impiegare: come un trattamento antibiotrico, circa 300-400 litri/ettaro.

Per controlli e strategie di lotta contattate i tecnici del Consorzio.

IMPORTANTE!!!!

Il Clorpirifos-etile ed il Thiamethoxam vengono usati anche per la lotta allo Scafoideo, quindi se effettuati entro questa settimana (15 luglio) assumono duplice funzione.

N.B.: Le sostanze attive indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni riportate nelle **NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA EMANATE DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.**

Per informazioni o richieste di sopralluoghi contattare il tecnico **MOSCHIONI MONICA** telefonando ai numeri: 0481 61833 ufficio - 340-5050014, oppure inviare una mail all'indirizzo assistenzatecnica@vinidocisonzo.it.