

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 19 del 12 giugno 2024


ANDAMENTO METEOROLOGICO

Anche in quest'ultima settimana le precipitazioni sono state mediamente abbondanti. La situazione meteorologica sembra avviarsi verso un netto miglioramento (speriamo!).

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

In tutto il territorio regionale tutte le varietà sono nella fase fenologica di fine allegagione-accrescimento acini.



Fenologia media riferita al grappolo delle diverse varietà monitorate in regione nella corrente settimana (24^a).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

Le condizioni meteorologiche estremamente favorevoli al patogeno protrattasi ormai da diverse settimane hanno portato, con un ampio anticipo rispetto alla media delle passate annate, alla perdita totale della produzione in quasi tutti i testimoni presenti in Regione.

Presenti in molti vigneti infezioni fogliari di peronospora. Sui grappoli al momento le segnalazioni sono solo sporadiche e legate a strategie di difesa che non hanno garantito una costante copertura della vegetazione.

Permangono condizioni di suscettibilità molto elevate legate alla fase fenologica di accrescimento degli acini.

Solo il miglioramento delle condizioni meteorologiche può abbassare la pressione della malattia.

Oidio

Nella zona collinare a est della regione sono stati osservati i primissimi sintomi sugli acini limitatamente a vigneti storicamente soggetti a forti attacchi.

Alta in questa fase la sensibilità specie su grappolo. L'innalzamento delle temperature e dell'umidità dell'aria può aumentare la pressione della malattia.

Black rot

Situazione al momento stabile.

Parassiti

Scaphoideus titanus

Si stanno ultimando i controlli in tutta la regione sugli stadi giovanili.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei dati, aggiornati alla fine della scorsa settimana, da cui si evidenzia, rispetto agli anni precedenti, sia una riduzione dei vigneti con presenza del vettore che il numero medio di individui per pollone.

FORME GIOVANILI	2021	2022	2023	2024 (Parziali)
N. vigneti controllati	320	390	336	329
N. vigneti con S. t.	90 (28%)	237 (61%)	130 (39%)	77 (23%)
Media giovani/pollone	0,14	0,33	0,11	0,07

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora

Qualora dopo l'esecuzione del trattamento intervengano precipitazioni intense o prolungate si raccomanda di adottare l'intervallo tra i trattamenti inferiore indicato in etichetta dei prodotti utilizzati.

In assenza di precipitazioni invece si possono adottare gli intervalli massimi.

Si possono utilizzare prodotti con un'elevata affinità con le cere particolarmente attivi nella difesa del grappolo quali: Ametoctradina, Amisulbrom, Cyazofamide, Zoxamide, Mandipropamide e Benalaxil.

Per ridurre il rischio di insorgenza di resistenze:

- questi prodotti monosito vanno associati a un partner di copertura (Folpet, Metiram, Fluazinam). Dall'allegagione alla fase di chiusura grappolo va evitato l'utilizzo del Dithianon per possibili fenomeni di fitotossicità sull'acino;
- per Zoxamide viene consigliato un solo intervento all'anno in quanto in diverse parti della Regione sono stati ritrovati ceppi di peronospora poco sensibili a questa molecola. Un eventuale secondo trattamento (da effettuare solo in casi di estrema necessità) deve essere comunque distanziato e alternato con un prodotto con un meccanismo di azione diverso;
- impiegare i prodotti monosito aventi stesso meccanismo d'azione possibilmente non più di due volte consecutivamente e per solo 3 trattamenti anno;
- nell'alternanza dei diversi prodotti è opportuno non far seguire direttamente Ametocradina a Amisulbron o Cyazofamide e viceversa.

Il rischio di resistenza degli antiperonosporici applicabili in viticoltura è riportato nella tabella 1

Tab. **Rischio di resistenza degli antiperonosporici**

Principi attivi	Gruppi	Sito targhet	Rischio resistenza	Indicazioni Frac
Ossidi, Ossicloruri, Idrossidi, Poltiglie, ecc.	Rameici	Multisito	Basso	
Ditianon	Chinoni	Multisito	Basso	
Metiram	Ditio-carbammati	Multisito	Basso	
Folpet	Ftalimidici	Multisito	Basso	
Cymoxanil	Ciano-acetamidi	Sconosciuto	Medio-Basso	Gestione necessaria
Fosetyl Alluminio, Fosfonati	Fosfonati	Stimolazione difese. Meccanismo non chiaro	Basso	No indicazioni
Metalaxyl-M, Metalaxil Benalaxyl-M	Fenilamidi	RNA polimerasi	Elevato	Gestione necessaria
Dimetomorf, Mandipropamid Iprovalicarb, Benthiavalicarb, Valifenalate	CAA	Cellulosa sintetasi	Medio-Basso	Gestione necessaria
Azoxystrobin, Pyraclostrobin	QoI	Inibizione complesso III catena respiratoria	Elevato	Gestione necessaria
Cyazofamid, Amisulbrom	Qil	Inibizione complesso III catena respiratoria	Medio-Elevato	Gestione necessaria
Ametoctradin	QoSI	Inibizione complesso III catena respiratoria	Medio-Elevato	Gestione necessaria
Oxathiapiprolin	Pirazoli Carbossammidi	Sintesi dei lipidi e integrità membrane	Medio-Elevato	Gestione necessaria
Zoxamide	Toluoamidi	Mitosi	Medio-Basso	Gestione necessaria
Fluopicolide	Piridinmetil-benzamidi	Delocalizzazione proteine di membrana	Non noto	
Fluazinam	2,6 dinitro-aniline	Fosforilazione ossidativa	Basso	

Oidio

Contro questo patogeno sono impiegabili:

- Cyflufenamid, Proquinazid, Metrafenone.
- IBE (Penconazolo*, Tetraconazolo, Mefentrifluconazolo, Difenonazolo**, Tebuconazolo**), avendo l'accortezza di non superare i 3 trattamenti all'anno e non più di due consecutivi;
- strobilurine avendo l'accortezza di non superare i 3 trattamenti all'anno e non più di due consecutivi;

In tutte le ipotesi aggiungere 2 Kg /Ha di Zolfo bagnabile.

(*) informarsi presso le cantine di conferimento su eventuali limitazioni commerciali con l'estero.

(**) massimo 1 intervento in alternativa tra Difenonazolo e Tebuconazolo nel DPI FVG 2024

Black rot

Contro questo patogeno sono efficaci:

- gli IBE (Penconazolo, Tetraconazolo, Mefentrifluconazolo Difenonazolo, Tebuconazolo);
- le Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin);
- il Metiram e il Fluazinam.

Per queste molecole valgono le indicazioni riportate nel paragrafo Peronospora e Oidio.

Botrite

Le strategie per il contrasto di questo patogeno sono state illustrate nel bollettino n. 17 del 31 maggio 2024 e integrate nel bollettino della scorsa settimana.

Flavescenza dorata della vite (FD)

Si riporta quanto indicato già nel precedente avvertimento.

Visto i dati dei rilievi su riportati il trattamento post fiorale con prodotti sistemici (Acetamiprid, Flupyradifurone e Sulfoxaflor) non si rende necessario nella stragrande maggioranza dei vigneti. Solo nei casi in cui il monitoraggio aziendale individui la presenza di popolazioni dell'insetto consistente o nel vigneto siano presenti o siano state eliminate diverse piante con sintomi di FD può essere eseguito un trattamento con i prodotti sopra richiamati da posizionare subito dopo la fine della fioritura.

Nei vigneti che non rientrano in questi casi appena descritti ma che si trovano in aree "focolaio" (forte presenza di Scafoideus e di viti infette nell'intera area) consultare il SFR o il tecnico di riferimento per capire il corretto e migliore posizionamento del trattamento aggiuntivo.

DEROGA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Si ricorda che il 31 maggio 2024 è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione di due ulteriori interventi con le s.a. comprese nel gruppo "folpet, dithianon, fluazinam" per la difesa da Plasmopara viticola sulla coltura della vite da vino.

Il decreto è consultabile al seguente link:

http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2024/Deroghe%202024/deroghe-fvg-2013-anno-2024-che-richiedono-provvedimenti-di-deroga/Deroga%20%20FOLPET_DITIANON_FLUAZINAM%20VITE_MAGGIO24.pdf/view

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... *nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...*".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api e di pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi, diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

ADOZIONE DELLE MODIFICHE ALLE SCHEDE TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLA VITE DA VINO E UVA DA TAVOLA.

Con Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA n. 298 del 31 maggio 2024 sono stati corretti, nelle schede vite da vino e uva da tavola, dei refusi presenti per mero errore materiale.

Tutte le modifiche intervenute sono disponibili al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2024/decreto-n-298-del-31-05-2024/>

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.
PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.