

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 22 del 02 luglio 2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Le precipitazioni di lunedì scorso sono risultate trascurabili praticamente in tutto il territorio regionale.

Il tempo rimarrà stabile con temperature molto sopra la media del periodo fino a fine settimana. Tra domenica e lunedì si profila un cambio di scenario, con l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico che potrebbe portare un deciso calo termico e fenomeni temporaleschi.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

In tutta la regione i Pinot e lo Chardonnay sono in chiusura del grappolo (BBCH 79).

Dalla prossima settimana nelle zone più precoci su queste varietà potrebbero comparire i primi acini invaiati.

Per Glera, Ribolla gialla e Merlot continuano gli accrescimenti degli acini.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora Oidio Black rot

L'andamento climatico con scarse precipitazioni, temperature elevate e ridotte bagnature fogliari che ha caratterizzato le ultime settimane ha creato condizioni sfavorevoli ai principali patogeni. Nella quasi totalità dei vigneti non si segnalano infezioni di nessun patogeno.

Si ricorda che dalla fase fenologica di chiusura grappolo pre-invaiatura inizia a ridursi la sensibilità del grappolo a peronospora e oidio. La sensibilità al Black rot rimane invece elevata fino all'invaiatura.

In questa fase rimane elevata la sensibilità delle giovani femminelle alla peronospora naturalmente nei vigneti dove non ci sono arresti vegetativi legati alla carenza idrica e qualora le condizioni climatiche determinino un aumento delle bagnature notturne.

Mal dell'esca della vite

In forte aumento la comparsa dei sintomi di mal dell'esca. La varietà più sensibile risulta la Glera.

Parassiti

Tignole

Il volo delle tignole è ovunque in calo con diverse postazioni dove non si sono registrate più catture.

Cocciniglie

La situazione nei territori è molto eterogenea per cui vanno controllati attentamente i vigneti specie quelli che nella scorsa annata hanno manifestato infestazioni importanti.

Per *Planococcus ficus* si segnalano in diversi vigneti una consistente migrazione di neanidi di seconda generazione e i primi casi di melata.

In presenza di infestazioni contattare i tecnici per stabilire il livello di presenza e valutare le strategie più opportune da adottare.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora

Posizionare prima delle piogge previste a partire da domenica un prodotto di copertura (Folpet Fluazinam, Rame).

Tra questi prodotti si ricorda che il Folpet ha la maggior azione contro la peronospora mentre il Fluazinam (se non ancora utilizzato) presenta anche una buona azione su Black rot e botrite).

Nei vigneti che dovessero presentare una elevata vigoria e sviluppi di nuova vegetazione importanti può essere abbinato al prodotto di copertura un ultimo intervento con Fosfonati* o Fosetil Al*, che permettono una buona protezione della nuova vegetazione.

Qualora si debba intervenire dopo una pioggia, in presenza di vegetazione non protetta già da diversi giorni, per bloccare eventuali infezioni è possibile impiegare, assieme ai prodotti di copertura, il Cymoxanil. Questo prodotto presenta una buona azione curativa se applicato entro 24 ore dall'evento infettante. Il prodotto migliora la propria efficacia se si acidifica l'acqua della miscela fitosanitaria (25-30 gr/hl di acido citrico).

() Questi prodotti lasciano facilmente residui nelle uve per cui è importante non eccedere nel numero di applicazioni annue (preferibilmente non oltre i 4-5 trattamenti). Verificare con le cantine dove si conferisce l'uva eventuali limitazioni di impiego.*

Oidio e Black rot

Utilizzare lo zolfo in abbinamento ai prodotti di copertura antiperonosporici.

Nelle zone che storicamente presentano una forte pressione dell'oidio è possibile utilizzare Metrafenone o Pyriofenone o Proquinazid o Cyflufenamid.

Per chi avesse ancora a disposizione un terzo intervento con una strobilurina o con un IBE può utilmente impiegarli in questa fase per il controllo congiunto di oidio e Black rot.

Parassiti

Scaphoideus titanus

In settimana anche negli areali più tardivi va effettuato il trattamento obbligatorio contro lo *Scaphoideus titanus*.

Flavescenza dorata della vite

Nei giorni successivi al trattamento insetticida obbligatorio è necessario effettuare un passaggio di controllo dei vigneti per eliminare le viti sintomatiche eventualmente comparse dopo i passaggi precedenti.

Questa operazione trova il momento ottimale in questa fase perché eliminando la parte aerea delle piante ammalate, avendo effettuato il trattamento insetticida che ha abbattuto le popolazioni, non si corre il rischio che eventuali insetti presenti sulle piante estirpate/capitozzate si spostino sulle viti sane.

Concimazioni fogliari

L'andamento climatico del periodo caratterizzato da stress idrici e temperature molto elevate favorisce le carenze di magnesio (ingiallimenti internervali sulle foglie basali della varietà Glera,

disseccamento del rachide su Verduzzo friulano e Cabernet Sauvignon). Su queste varietà si consiglia pertanto di effettuare 2 trattamenti con concimi a base di solfato di magnesio.

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NON SELETTIVI PER LE API E I PRONUBI

Il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA dispone che in ogni fase fenologica delle colture, **prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi** nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, **è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.**

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_difesa_integrata)
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.