

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE  
n° 11 del 14 maggio 2025**

**ANDAMENTO METEOROLOGICO**

Lunedì 12 si sono registrate piogge di bassa media intensità (da 0 mm a 30 mm). Le aree a maggiore precipitazione sono risultate quelle della città di Udine e comuni limitrofi e in una fascia media della pianura udinese e pordenonese.

Giovedì è previsto tempo stabile in avvio di giornata, segue dal pomeriggio-sera un progressivo e diffuso peggioramento. Sono previste piogge a carattere di rovescio o temporale, in particolare tra i settori prealpini e le aree di pianura. Venerdì su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti da poco nuvoloso a variabile. Per i giorni successivi permangono condizioni di variabilità anche se non sono ancora ben definiti entità e localizzazione dei fenomeni.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

**FENOLOGIA**

In quest'ultima settimana si è registrato in incremento medio di 2 foglie per germoglio mentre è continuata in modo importante la distensione degli internodi. I grappoli si trovano mediamente tra grappoli separati e bottoni fiorali che sono in fase di separazione (fasi 55 - 57 BBCH). In un paio di vigneti della zona collinare dei Colli orientali su versanti ben esposti e su varietà Chardonnay è stato rinvenuto qualche singolo fiore aperto.




Fig.1 Sviluppo medio dei germogli rilevati all'inizio di questa settimana (settimana n.20) a confronto con i dati della settimana precedente.

## **SITUAZIONE FITOSANITARIA**

### **Patogeni**

#### **Peronospora**

Nei testimoni non trattati di San Vito al Tagliamento e Latisana sono risultate in aumento le infezioni. In particolare per quello di San Vito al Tagliamento si è raggiunta una diffusione media di una foglia per vite con macchie di peronospora, esito del completamento dell'evasione delle infezioni primarie avviate con le piogge del periodo 23-26 aprile e anche delle prime infezioni secondarie avviate con le piogge iniziate il 4 maggio.

Permane buona la situazione fitosanitaria dei vigneti trattati secondo le indicazioni dei bollettini.

#### **Oidio**

Anche per questa settimana non si segnalano variazioni significative rispetto alla scorsa.

#### **Black rot**

Si conferma per questo patogeno la situazione illustrata nel bollettino della scorsa settimana.

Le uniche segnalazioni di nuove macchie fresche su foglia sono provenienti dai testimoni non trattati da inizio stagione.

Rimane fondamentale il controllo dei vigneti da parte dei viticoltori.

### **Parassiti**

#### **Tignole**

Sono prossimi all'esaurimento i voli di entrambe le specie.

#### **Cocciniglie**

Per quanto riguarda il *Partenolecanium corni* in tutti i siti di monitoraggio si riscontra la presenza di femmine in ovideposizione. Per il *Planococcus ficus* prime segnalazioni di inizio migrazione.

#### **Scaphoideus titanus**

Tra ieri e oggi si sono trovati i primi giovani della cicalina sia in pianura (Casarsa della Delizia, Sesto al Reghena e Ruda) che nelle zone collinari (Cividale del Friuli, Premariacco e Corno di Rosazzo).

## **STRATEGIE DI DIFESA**

**Le indicazioni sul posizionamento del prossimo intervento saranno diramate con un bollettino dedicato che uscirà tra giovedì o venerdì mattina per avere informazioni più aggiornate sul meteo dei prossimi giorni.**

#### **Peronospora**

In questa fase i prodotti consigliati sono :

- Fenilamidi (Metalaxil-M, Metalaxil o Benalaxil-M,);
- CAA (Dimetomorf (\*), Mandipropamide, Iprovalicarb o Valifenalate);
- Fluopicolide;
- Fosfonati o Fosetil Al;

Ai prodotti sopraccitati vanno abbinati Folpet o Dithianon.

Si ricorda che per una corretta gestione delle resistenze non si devono effettuare più di 3 trattamenti all'anno con prodotti monosito che posseggono lo stesso meccanismo d'azione e non più di due consecutivi (Fosfonati e Fosetil AL non sono da considerare come monosito).

(\*) sostanza attiva revocata, scadenza dell'utilizzo in campo delle giacenze in magazzino fino al 20 Maggio 2025.

#### **Oidio**

Per il controllo di questo patogeno si consiglia l'impiego di zolfi a dosaggi elevati qualora l'intervallo tra i trattamenti non superi gli 7-8 giorni.

Nelle zone a forte pressione della malattia (vigneti di collina o vigneti con danni importanti nelle scorse stagioni), o dove non si impiega il Dithianon per il controllo di peronospora e Black rot possono essere applicati gli IBE. Si ricorda che il Difenoconazolo può essere applicato una sola volta nell'anno per chi aderisce all'SQNPI. Vista la sua elevata efficacia su Black rot si consiglia il posizionamento di questa molecola in post fioritura.

### **Black rot**

Le strategie proposte per peronospora e oidio contemplano il controllo anche di questo patogeno (Dithianon, IBE, Thiopron).

Visto che le molecole disponibili per il controllo di questo patogeno sono limitate è opportuno non utilizzarne più di una per trattamento (ad esempio non utilizzare Dithianon e IBE nello stesso trattamento).

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### **Volumi di distribuzione**

In questa fase per attrezzature a volume normale (10 hl/ha in piena vegetazione) per garantire l'efficacia dell'intervento fitosanitario fare riferimento a un volume di distribuzione di circa 8-9 hl di miscela/ha per le situazioni che consentono tale riduzione (vedi Bollettino n° 4/2025).

### **Concimazioni fogliari**

In fioritura non si potranno effettuare concimazioni fogliari. Per cui chi ne ha la necessità deve intervenire quanto prima.

### **Operazioni sulla parete vegetativa**

Affrettarsi a concludere la spollonatura su tutte le varietà. Si ricorda che per il monitoraggio dei giovani di *Scaphoideus titanus* è utile lasciare a rondon qualche vite/gruppo di viti da spollonare 30/50 a Ha.

Visti gli accrescimenti dell'ultimo periodo è necessario effettuare le operazioni di palizzata/legatura dei germogli o gestione della chioma.

Utile nelle forme a spalliera l'effettuazione della scacchiatura dei germogli mal inseriti o deboli e non produttivi per ridurre l'affastellamento della vegetazione e migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

**Informazioni più dettagliate e calate sui singoli areali potranno essere indicate nei bollettini zionali diramati dai Consorzi DOC.**

### **REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI**

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

[http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

### **INFORMAZIONE IMPORTANTE:**

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_IPM)  
Per iscriverti clicca qui: [https://t.me/ERSA\\_vite\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_IPM)

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM">https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM">https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM">https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM">https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM">https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM">https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM</a>

**Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:**

[http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati\\_avvisi\\_comunicazioni/telegram\\_avviso5.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf)

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.