

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 12 del 15 maggio 2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Per la giornata di venerdì è previsto bel tempo. Nei giorni successivi il tempo si presenta instabile con la possibilità di piogge quasi ogni giorno anche se di debole intensità alternate a schiarite. Vista questa incertezza si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti delle previsioni per individuare i momenti migliori in cui eseguire il trattamento.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

STRATEGIE DI DIFESA

Il corretto posizionamento del prossimo trattamento dipende essenzialmente da due fattori:

- **quantità di pioggia caduta dopo l'ultimo trattamento;**
- **andamento meteo e finestre utili per trattare.**

Se dopo l'ultimo trattamento le precipitazioni hanno superato i 20mm è preferibile eseguire il trattamento entro il fine settimana, in caso contrario si può posticipare ad inizio prossima settimana.

Per entrambe le ipotesi si dovrà poi scegliere la giornata che permette di eseguire il trattamento nelle migliori condizioni (vegetazione asciutta, bassa ventosità, ecc.).

Peronospora

In questa fase i prodotti consigliati sono:

- Fenilamidi (Metalaxil-M, Metalaxil o Benalaxil-M,);
- CAA (Dimetomorf (*), Mandipropamide, Iprovalicarb o Valifenalate);
- Fluopicolide;
- Fosfonati o Fosetil Al;

Ai prodotti sopraccitati vanno abbinati Folpet o Dithianon.

Si ricorda che per una corretta gestione delle resistenze non si devono effettuare più di 3 trattamenti all'anno con prodotti monosito che posseggono lo stesso meccanismo d'azione e non più di due consecutivi (Fosfonati e Fosetil AL non sono da considerare prodotti monosito).

(*): sostanza attiva revocata, scadenza dell'utilizzo in campo delle giacenze in magazzino fino al 20 Maggio 2025.

Oidio

Per il controllo di questo patogeno si consiglia l'impiego di zolfi a dosaggi elevati qualora l'intervallo tra i trattamenti non superi gli 7-8 giorni.

Nelle zone a forte pressione della malattia (vigneti di collina o vigneti con danni importanti nelle scorse stagioni), o dove non si impiega il Dithianon per il controllo di peronospora e Black rot possono essere applicati gli IBE in associazione a una dose minima di zolfo. Si ricorda che il Difenconazolo può essere applicato una sola volta nell'anno per chi aderisce all'SQNPI. Vista la

sua elevata efficacia su Black rot si consiglia il posizionamento di questa molecola in post fioritura.

In questa fase l'IBS può essere sostituito dal Meptil dinocap o dalla Spiroxamina qualora l'azienda non abbia già utilizzato ognuna di queste molecole per due trattamenti.

Black rot

Le strategie proposte per peronospora e oidio contemplano il controllo anche di questo patogeno (Dithianon, IBE, Thiopron).

Meptil dinocap e Spiroxamina non presentano attività nei confronti del Black rot.

Visto che le molecole disponibili per il controllo di questo patogeno sono limitate è opportuno non utilizzarne più di una per trattamento (ad esempio non utilizzare Dithianon e IBE nello stesso trattamento).

ALTRE INFORMAZIONI

Volumi di distribuzione

In questa fase per attrezzature a volume normale (10 hl/ha in piena vegetazione) per garantire l'efficacia dell'intervento fitosanitario fare riferimento a un volume di distribuzione di circa 8-9 hl di miscela/ha per le situazioni che consentono tale riduzione (vedi Bollettino n° 4/2025).

Concimazioni fogliari

In fioritura non si potranno effettuare concimazioni fogliari. Per cui chi ne ha la necessità deve intervenire quanto prima.

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni più dettagliate e calate sui singoli areali potranno essere indicate nei bollettini zonal diramati dai Consorzi DOC.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_IPM)
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zonal sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zonal.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:
http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.