

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 14 del 29 maggio 2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Dopo l'ultimo trattamento (posizionato a seconda dei casi a cavallo del fine settimana) le precipitazioni sono state ovunque limitate.

Nei prossimi giorni il tempo sarà, in genere, più stabile e caldo dei giorni scorsi.

Si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti delle previsioni per individuare i momenti migliori in cui eseguire il trattamento.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

Siamo nella fase della fioritura. Si riscontrano differenze significative sia tra varietà che tra areali.




Fig.1 Fenologia media dei grappoli per varietà all'inizio di questa settimana (settimana n.22) a confronto con i dati della settimana precedente. La fase della fioritura è compresa tra BBCH 60 a BBCH 69.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

È peggiorata in questa settimana l'incidenza della malattia nei testimoni non trattati di tutte le zone in particolare su grappolo. A San Vito al Tagliamento le foglie con macchie superano il 40% mentre i grappoli colpiti si attestano a ben oltre il 50%.

Nei vigneti trattati la situazione al momento è buona anche se in diversi appezzamenti sono presenti sporadiche macchie.

I modelli previsionali indicano l'evasione delle eventuali infezioni che hanno preso avvio con le piogge di giovedì 22 maggio a partire dal fine settimana. Si consiglia pertanto di effettuare un monitoraggio accurato di tutti i vigneti.

Oidio

Invariata la situazione per questo patogeno rispetto alle scorse settimane.

Black rot

Nessuna nuova segnalazione.

Parassiti

Tignole

Continuano i monitoraggi dei nidi larvali della I generazione. Al momento la diffusione è molto bassa.

Cocciniglie

Per quanto riguarda il *Partenolecanium corni* è iniziata la schiusura delle prime uova. Per il *Planococcus ficus* continua la migrazione (di limitata entità) delle neanidi della prima generazione.

Scaphoideus titanus

I monitoraggi eseguiti su oltre 200 vigneti in tutta la Regione evidenziano l'assenza del vettore nell'85% dei siti.

Nel restante 15% il vettore è presente ma solo in alcuni casi supera i 5 individui su 50 polloni che consideriamo come limite per ammettere il trattamento supplementare con sistemici nell'immediata post fioritura.

Raccomandiamo di eseguire il monitoraggio in tutti i vigneti seguendo le indicazioni riportate nel precedente bollettino.



Altre avversità

Flavescenza dorata della vite

È necessario **eseguire in questo momento un primo sopralluogo in campo per la capitozzatura e successiva rimozione delle piante sintomatiche colpite da giallumi**, in quanto in questa fase il vettore è poco mobile e non ancora in grado di trasmettere il fitoplasma ad altre piante. Tale operazione risulta essere quindi un'ottima azione di prevenzione per la diffusione della malattia.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora

La scelta dei principi attivi da impiegare nel prossimo trattamento è funzione da un lato dai prodotti utilizzati nel trattamento precedente e dall'altro dalla fase fenologica in cui si troverà il vigneto al momento del prossimo intervento.

Utilizzare preferibilmente l'Oxathiapiprolin in miscela con Folpet o Amisulbrom se non utilizzato nello scorso trattamento.

Dove è già stato applicato l'Oxathiapiprolin sono impiegabili:

- se la vite al momento del trattamento sarà ancora in fioritura:
 - Fenilamidi (Metalaxyl-M, Metalaxyl o Benalaxyl-M,);
 - CAA (Mandipropamide, Iprovalicarb o Valifenalate);
 - Fosfonati o Fosetil Al;Ai prodotti sopraccitati vanno abbinati Folpet o Dithianon.
- se la fioritura è ultimata e la vite si trova in allegagione è possibile utilizzare i prodotti affini alle cere (cerodinamici) Ametoctadina, Amisulbrom, Cyazofamide, Zoxamide (*) in miscela con un partner (Folpet, Fluazinam (**), Fosfonati o Fosetil Al).

(*) per una corretta strategia antiresistenza impiegare questo p.a. al max 2 volte all'anno in trattamenti non consecutivi.

(**) questo p.a. presenta un'azione principale su peronosporica e botrite e un'attività collaterale su Black rot e oidio.

Non essendo intervenuti in questa settimana forti eventi piovosi si possono adottare gli intervalli tra i trattamenti indicati in etichetta.

Oidio

Per il controllo di questo patogeno si consiglia l'impiego di **strobilurine** (Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin) in abbinamento a una ridotta dose di zolfo (2 kg /ha).

Negli anni si è osservato che l'applicazione delle strobilurine in questa fase riduce la presenza dello *Scaphoideus titanus* nei vigneti.

Black rot

Le strategie proposte per peronospora e oidio contemplano il controllo anche di questo patogeno (Dithianon, Fluazinam e strobilurine).

Parassiti

Scaphoideus titanus

Sono state pubblicate le circolari per la difesa obbligatoria dallo *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata della vite, che sono consultabili al link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/fitosanitaria/lotta-obbligatoria-contro-la-flavescenza-dorata-della-vite-e-il-vettore-scaphoideus-titanus-anno-2025/>

Anche per quest'anno è previsto, sui vigneti **di tutto il territorio regionale, 1 intervento obbligatorio con prodotti insetticidi ad azione abbattente.**

Informazioni più dettagliate sul periodo di effettuazione di questo intervento saranno fornite con i prossimi bollettini.

Per i trattamenti nelle fasce di rispetto (corpi idrici, artropodi non bersaglio, ecc.) si ricorda che:

...."Solo nelle situazioni in cui le sostanze attive indicate nella presente nota tecnica non siano utilizzabili a causa di specifiche normative (per esempio per limitazioni riportate in etichetta, fasce di sicurezza non trattate da corpi idrici, da aree sensibili, etc.), verrà considerato valido ai fini del trattamento obbligatorio l'utilizzo di qualsiasi sostanza attiva autorizzata per l'impiego contro Scaphoideus titanus e ammessa nello specifico contesto. Per quest'anno solo qualora non sia reperibile il prodotto fitosanitario a base di silicato di alluminio (caolino) registrato per usi emergenziali qualche settimana fa, si ammette la possibilità di impiegare il caolino classificato come corroborante.

Si ricorda che ei trattamenti utilizzabili nelle fasce di rispetto (caolino, ecc.) vanno applicati già a partire dalle prime fasi giovanili.

*Con particolare riferimento alla tutela del patrimonio apistico e dei pronubi in generale, si ricorda **il divieto di utilizzo di prodotti insetticidi (ad esclusione del silicato di alluminio) durante le fioriture**, e si sottolinea la **necessità, prima di effettuare trattamenti insetticidi, di sfalciare le piante spontanee in fiore**, così come previsto dal Decreto del direttore del Servizio Fitosanitario e chimico n. 18 del 26 marzo 2012.".....*

ALTRE INFORMAZIONI

Volumi di distribuzione

In fioritura i dosaggi dei prodotti fitosanitari vanno riferiti a un volume di miscela pari a 10 hl/ha.

Informazioni più dettagliate e calate sui singoli areali potranno essere indicate nei bollettini zionali diramati dai Consorzi DOC.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:

	Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM
---	---

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi

anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zonali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.