


SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 23 del 09 luglio 2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Nell'immagine riportata sotto, tratta dal sito dell'OSMER, si può notare che nelle ultime tre giornate (6-7-8 luglio) si sono verificate precipitazioni molto elevate specie nell'alta pianura (indicativamente a Nord della S.S.13 Pontebbana). Piogge contenute si sono registrate solo nella fascia litoranea.



Da oggi mercoledì 9 luglio ritorno del tempo stabile con pressione atmosferica in rialzo e temperature su valori decisamente più gradevoli rispetto ai giorni scorsi. Probabile un lieve incremento dell'instabilità da venerdì in poi con qualche nuovo locale temporale anche in pianura.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersas al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

In tutta la regione i Pinot e lo Chardonnay sono in chiusura del grappolo (BBCH 79). L'invaiaitura non è ancora iniziata anche se per il PG siamo prossimi; infatti in qualche raro vigneto si sono osservati i primissimi acini che iniziano a virare di colore.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora, Oidio e Black rot

Nella quasi totalità dei vigneti non si segnalano nuove infezioni di nessun patogeno ad eccezione di qualche attacco di peronospora su femminelle in vigneti con elevata vigoria e dove si sono allungati eccessivamente gli intervalli tra i trattamenti.

Si ricorda che in questa fase cala la sensibilità del grappolo a peronospora e oidio. La sensibilità al Black rot rimane invece elevata fino alla piena invaiatura.

In questa fase rimane elevata la sensibilità delle giovani femminelle alla peronospora specialmente nei vigneti più vigorosi e negli areali più umidi.

Parassiti

Cocciniglie

La situazione nei territori è molto eterogenea per cui vanno controllati attentamente i vigneti specie quelli che nella scorsa annata hanno manifestato infestazioni importanti.

Per *Planococcus ficus* si segnalano in diversi vigneti una consistente migrazione di neanidi di seconda generazione e i primi casi di melata. Stanno comparando i primi adulti di seconda generazione.

In presenza di infestazioni contattare i tecnici per stabilire il livello di presenza e valutare le strategie più opportune da adottare.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora

In tutte le zone dove si sono verificate precipitazioni intense è opportuno ristabilire la copertura il prima possibile e comunque prima dei possibili temporali previsti per il fine settimana.

I prodotti utilizzabili in questa fase sono il Folpet* e il Rame. Il Folpet è da preferire in tutti gli areali dove la pressione del patogeno è più elevata (zone con maggiori bagnature notturne, vigneti molto vigorosi, varietà molto sensibili e dove le precipitazioni sono state più intense, ecc.).

Nei vigneti che dovessero presentare una elevata vigoria e sviluppi di nuova vegetazione importanti può essere abbinato al prodotto di copertura il Metalaxyl** che permette l'allungamento dei turni e una buona protezione della nuova vegetazione.

Qualora si debba intervenire dopo una pioggia, in presenza di vegetazione non protetta già da diversi giorni, per bloccare eventuali infezioni è possibile impiegare, assieme ai prodotti di copertura, il Cymoxanil. Questo prodotto presenta una buona azione curativa se applicato entro 24 ore dall'evento infettante. Il prodotto migliora la propria efficacia se si acidifica l'acqua della miscela fitosanitaria (25-30 gr/hl di acido citrico).

() Per chi aderisce al SQNPI il numero complessivo di interventi con Folpet, Dithianon e Fluazinam non possono superare i dodici interventi annui.*

*(**) Verificare con le cantine dove si conferisce l'uva eventuali limitazioni di impiego.*

Oidio

Utilizzare lo zolfo (indicativamente a 3-4 kg/ha) in abbinamento ai prodotti di copertura antiperonosporici.

Black rot

Chi nell'ultimo intervento ha utilizzato un prodotto specifico anche per il Black rot (IBS o Strobilurine) può considerarsi protetto anche per le piogge previste per il fine settimana. In questa fase si ricorda che il rame e lo zolfo (specie se in formulazione liquida) presentano un'azione sufficiente contro questo patogeno, se non sono presenti infezioni in atto o un forte inoculo.

Flavescenza dorata della vite

Nei giorni successivi al trattamento insetticida obbligatorio è necessario effettuare un passaggio di controllo dei vigneti per eliminare le viti sintomatiche eventualmente comparse dopo i passaggi precedenti.

Questa operazione trova il momento ottimale in questa fase perché eliminando la parte aerea delle piante ammalate, avendo effettuato il trattamento insetticida che ha abbattuto le popolazioni, non si corre il rischio che eventuali insetti presenti sulle piante estirpate/capitozzate si spostino sulle viti sane.

Il Servizio Fitosanitario dell'ERSA sta effettuando sul territorio dei controlli per verificare il rispetto del Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario n° 543 del 10 ottobre 2023 che prevede tra l'altro:

- *l'obbligo del trattamento insetticida contro lo Scaphoideus titanus;*
- *l'obbligo dell'estirpo di tutte le viti sintomatiche;*
- *la sanzione per chi non rispetta le indicazioni dell'Decreto.*

Concimazioni fogliari

L'andamento climatico del periodo caratterizzato da sbalzi idrici favorisce le carenze di magnesio (ingiallimenti internodali sulle foglie basali della varietà Glera, disseccamento del rachide su Verduzzo friulano e Cabernet Sauvignon). Su queste varietà si consiglia pertanto di effettuare 2 trattamenti con concimi a base di solfato di magnesio.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_IPM)
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM

ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.