

## SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

### **BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 25 del 23 luglio 2025**

#### **ANDAMENTO METEOROLOGICO**

Ad inizio settimana una perturbazione ha interessato la nostra regione con precipitazioni anche intense ma a macchia di leopardo e in alcune zone anche con un po' di grandine.

La settimana proseguirà all'insegna della spiccata variabilità e dell'instabilità crescente. La presenza infatti dell'anticiclone sul Mediterraneo orientale e di una depressione sulla Francia favoriscono per i prossimi giorni l'afflusso sulla nostra regione di correnti sudoccidentali più umide ed instabili. Rovesci e temporali sono altamente probabili anche in pianura e saranno associate a un generale calo delle temperature.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

#### **FENOLOGIA**

È iniziata l'inviatura per quasi tutte le varietà.

In particolare si segnala il veloce viraggio di colore sui Merlot.

#### **SITUAZIONE FITOSANITARIA**

##### **Patogeni**

##### **Peronospora**

Vengono segnalate in molti areali macchie di peronospora sulla nuova vegetazione.

L'entità delle infezioni è molto variabile e legata soprattutto alla vigoria del vigneto.

In questa fase rimane elevata la sensibilità delle giovani femminelle alla peronospora specialmente nei vigneti più vigorosi e negli areali più umidi dove le bagnature notturne sono più prolungate.

##### **Oidio e Black rot**

Per questi due parassiti non si segnalano nuove infezioni.

##### **Botrite**

Sulle varietà a grappolo compatto (Pinot e Chardonnay in particolare) si trovano con relativa facilità acini colpiti da botrite specie nei vigneti dove si sono verificate delle grandinate o sono presenti nidi di tignole.

##### **Parassiti**

##### **Cocciniglie**

Continuano ad aumentare le segnalazioni di vigneti con presenza di cocciniglie. A differenza degli anni scorsi dove la maggioranza dei casi era rappresentata da infestazioni di *Planococcus ficus* quest'anno si trovano con facilità anche danni da *Partenolecanium corni* (cocciniglia del nocciolo). Nelle infestazioni più forti si osserva la presenza di melata e di fumaggini.

La difesa chimica (i prodotti a disposizione sono pochissimi) spesso da sola non risolve definitivamente il problema che tende a ripresentarsi ancora più intenso nelle annate successive a causa dell'alterazione dell'equilibrio biologico del vigneto.

Interessante risulta la liberazione di insetti utili che parassitizzano o predano le cocciniglie.

Controllare pertanto, attentamente i vigneti e in presenza di infestazioni contattare i tecnici per stabilire il livello di presenza e valutare le strategie più opportune da adottare.

### **Tignole della vite**

In questa settimana si sono registrate le primissime catture in alcune località. Informazioni sulle strategie di difesa saranno fornite con il bollettino della prossima settimana.

## **STRATEGIE DI DIFESA**

### **Patogeni**

#### **Peronospora**

In questa fase è opportuno ristabilire la copertura a intervalli di 7-10 giorni (mantenere gli intervalli più stretti in caso di elevate bagnature notturne e/o in presenza di diffuse macchie di peronospora. Vista l'instabilità del tempo nei prossimi giorni si consiglia di non allungare eccessivamente gli intervalli tra i trattamenti.

In questa fase utilizzare prodotti a base di rame preferendo quelli che presentano la maggior resistenza al dilavamento (es. Ossido di rame o Poltiglie bordolesi).

Qualora si debba intervenire dopo una pioggia, in presenza di vegetazione non protetta già da diversi giorni, per bloccare eventuali infezioni è possibile impiegare, assieme ai prodotti di copertura, il Cymoxanil\*. Questo prodotto presenta una buona azione curativa se applicato entro 24 ore dalla pioggia infettante. Il prodotto migliora la propria efficacia se si acidifica l'acqua della miscela fitosanitaria con prodotti specifici o con 25-30 gr/hl di acido citrico.

*(\*) Nel DPI della Regione Friuli Venezia Giulia sono ammessi al massimo 3 interventi all'anno con questo P.a..*

#### **Oidio**

Contro questo patogeno utilizzare lo zolfo (indicativamente a 3 kg/ha).

#### **Black rot**

In questa fase si ricorda che il rame e lo zolfo (specie se in formulazione liquida) presentano un'azione sufficiente contro questo patogeno, se non sono presenti infezioni in atto o un forte inoculo.

#### **Botrite**

Le indicazioni per la difesa della botrite si trovano nel Bollettino n° 26 del 24 luglio "Speciale Botrite".

### **Monitoraggio Scaphoideus**

Il monitoraggio degli adulti dello Scaphoideus, la cicalina vettrice della Flavescenza dorata, può essere effettuato utilizzando apposite trappole cromotropiche ed ha la finalità di verificare l'efficacia del trattamento insetticida obbligatorio eseguito circa un mese fa.

Queste trappole vanno esposte nei vigneti per due settimane (installazione in vigneto questa settimana o inizio prossima, negli areali più tardivi entro i primi di agosto).

In commercio si trovano diverse tipologie di trappole. Non tutte hanno la stessa efficacia.

Si consiglia di disporre 2 trappole per azienda scegliendo un vigneto di medie dimensioni (almeno 5 mila metri), la prima trappola andrà disposta al centro del vigneto mentre la seconda al bordo (sul 2-3° interpalo o secondo terzo filare). Le trappole andranno posizionate a livello della prima coppia di fili all'interno della vegetazione, facendo in modo che le foglie non si attacchino alla trappola.

Per avere indicazioni dettagliate sull'installazione e sul successivo controllo si possono chiamare i tecnici dell'Ersa (Pierbruno Mutton 3389385518, Sandro Bressan 3357036242, Selena Tomada 3334822667, Giuseppe Quagliaro 3334823149).

## REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

[http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

### INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:

 Iscriviti al nostro canale Telegram: <a href="https://t.me/ERSA_vite_IPM">ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata</a> Per iscriverti clicca qui: <a href="https://t.me/ERSA_vite_IPM">https://t.me/ERSA_vite_IPM</a>
---

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM">https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM">https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM">https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM">https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM">https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM">https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM</a>

**Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:**

[http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati\\_avvisi\\_comunicazioni/telegram\\_avviso5.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf)

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.