



Da oggi a sabato alcuni fronti interesseranno la regione con correnti umide sudoccidentali che determineranno una situazione di marcata instabilità atmosferica. Sono attesi nuovi rovesci e temporali, localmente intensi, pur alternati a delle pause asciutte.

Le temperature si manterranno sotto la media del periodo, con clima di stampo autunnale. Da domenica è invece previsto un deciso miglioramento con ritorno a condizioni assolate anche se non si esclude una leggera variabilità pomeridiana nelle giornate di lunedì e martedì.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)  
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

## FASE FENOLOGICA

Nell'ultima settimana a causa degli abbassamenti termici l'accrescimento dei germogli è rimasto contenuto come la precedente con la formazione mediamente di 1,5 nuove foglie.

La fioritura è iniziata solo sulle varietà più precoci e sta procedendo abbastanza lentamente a causa delle condizioni meteo.

Nonostante il rallentamento di questi ultimi giorni il 2026 si conferma ancora una delle più precoci degli ultimi 10 anni.




Fig.1: Sviluppo medio dei germogli in regione rilevati all'inizio di questa settimana (settimana n.20).

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

### Peronospora

Si è conclusa l'evasione delle infezioni che hanno preso avvio con le piogge del 19-21 aprile. Sui testimoni non trattati l'infezione è risultata molto forte solo nel testimone di San Vito al Tagliamento dove la pioggia preparatoria del 13-15 aprile era stata più elevata.

Sporadiche macchie sono state osservate anche in qualche vigneto trattato evidenziando che mediamente i trattamenti posizionati in modo preventivo hanno garantito un'elevata protezione. Nel fine settimana dovrebbero evadere le infezioni avviate con le piogge del 5-6 maggio.

### Oidio

Nessuna segnalazione in questa settimana di nuove infezioni.

### Black rot

Al momento la situazione è tranquilla anche nei testimoni non trattati.

## **Tignole**

Si è concluso il volo di entrambe le specie. Si evidenzia in particolare da una parte la bassissima presenza su tutto il territorio regionale della tignola, dall'altra l'anticipo di circa una settimana dei voli collegato alle particolari condizioni meteo dell'annata.

## **Cocciniglie**

Si sono riscontrate le prime migrazioni di *Planococcus ficus* sulle foglie basali dei germogli. In questa fase non sono consigliati trattamenti specifici perché la maggior parte degli individui rimane riparato sotto il ritidoma.

Il monitoraggio con trappole a feromoni evidenzia che ancora non sono iniziati i voli dei maschi per cui è ancora possibile l'applicazione degli erogatori per la confusione sessuale.

## ***Scaphoideus titanus***

In aumento le popolazioni dello *Scaphoideus titanus* la cicalina vettrice della Flavescenza dorata della vite, sia come numero di vigneti con presenza che come entità delle presenze.

Al fine di poter capire l'entità delle popolazioni nei diversi vigneti si invita a lasciare dei polloni su alcune viti perché in questo periodo questa cicalina vive preferibilmente nella parte bassa della pianta. Nel prossimo bollettino daremo indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli.

## **Giallumi della vite**

La situazione dei giallumi sembra essere sicuramente più preoccupante rispetto allo scorso anno. Come riportato nei precedenti bollettini è opportuno iniziare/continuare l'eliminazione delle viti sintomatiche in modo da ridurre la fonte di inoculo presente nel vigneto.

Questa è un'operazione fondamentale in questa fase in cui inizia a essere presente il vettore.

## **STRATEGIE DI DIFESA**

### **Peronospora**

Il posizionamento del prossimo trattamento sarà legato:

- al momento in cui è stato eseguito l'ultimo intervento;
- all'entità delle precipitazioni cadute dopo l'ultimo trattamento;
- alle previsioni meteo della prossima settimana che al momento sembrano abbastanza buone anche se con un leggero rischio di variabilità pomeridiana per le giornate di lunedì e martedì.

Per chi ha trattato prima delle piogge di inizio settimana (da venerdì 8 a domenica 10) è opportuno rientrare subito dopo le piogge di questi giorni (tra domenica 17 e lunedì 18) e comunque prima di eventuali altre piogge.

Per chi invece ha ricoperto nella giornata di mercoledì 13 può posticipare il rientro dopo la metà della prossima settimana.

I prodotti utilizzabili sono quelli indicati nello scorso bollettino:

- **Fenilammidi** (Benalaxil-M, Metalaxil-M, Metalaxil);
- **CAA** (Mandipropamide, Iprovalicarb, Valifenalate);
- **Fosetil Alluminio o Fosfonati**;

associati ai prodotti di copertura (Folpet o Dithianon) e avendo l'accortezza di utilizzare un prodotto con meccanismo d'azione diverso di quello impiegato nel trattamento precedente; sono esclusi da questa limitazione il Fosetil Alluminio o i Fosfonati in quanto non dotati di meccanismo di azione monosito.

Per chi interverrà dopo la metà della prossima settimana, se è iniziata la fioritura su gran parte delle varietà, può valutare se utilizzare l'Oxathiapiprolin come endoterapico.

Si ricorda che in FVG per questa molecola è previsto un solo trattamento all'anno (come comunicato congiuntamente dalle Ditte distributrici) e solo per i formulati in miscela con Folpet o Amisulbrom.

### **Oidio**

Utilizzare formulati a base di **Strobilurine\*** (Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin) eventualmente addizionati di 1-2 Kg di **zolfo bagnabile** nei vigneti con maggior pressione del patogeno.

(\*) Negli anni si è osservato che l'applicazione delle strobilurine in questa fase riduce la presenza di *Scaphoideus titanus* nei vigneti.

### **Black rot**

Le strobilurine utilizzate contro l'oidio presentano un'ottima attività anche nei confronti del black

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### **Volumi di distribuzione**

In questa fase per attrezzature a volume normale (10 hl/ha in piena vegetazione) per garantire l'efficacia dell'intervento fitosanitario fare riferimento a un volume di distribuzione di circa 8-10 hl di miscela/ha in funzione dello sviluppo della parete vegetativa e naturalmente per le situazioni che consentono tale riduzione.

### **Concimazioni fogliari**

Si ricorda che i concimi fogliari sono fitotossici durante la fioritura per cui vanno sospesi in questa fase.

### **Operazioni sulla parete vegetativa**

Visti gli accrescimenti raggiunti procedere con le operazioni di palizzata/legatura dei germogli o gestione della chioma.

Utile nelle forme a spalliera l'effettuazione della scacchiatura dei germogli mal inseriti o deboli e non produttivi per ridurre l'affastellamento della vegetazione e migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

## **INFORMAZIONI GENERALI**

**Si informa che sul sito di ERSA sono pubblicati i Disciplinari di Produzione Integrata regionali 2026. Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSA all'indirizzo:**

<https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/produzione/disciplinari/index.html>

### **REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI**

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

[http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

### **INFORMAZIONE IMPORTANTE:**

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_IPM)  
Per iscriverti clicca qui: [https://t.me/ERSA\\_vite\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_IPM)

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

| Nome dei canali  | Link diretti ai canali  |
|--|---|
| ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata | <a href="https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM">https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM</a>       |
| ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata                    | <a href="https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM">https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM</a>                   |
| ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata                    | <a href="https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM">https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM</a>                     |
| ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata          | <a href="https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM">https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM</a> |
| ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata                   | <a href="https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM">https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM</a>                   |
| ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata                     | <a href="https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM">https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM</a>                     |

**Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:**  
[http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati\\_avvisi\\_comunicazioni/telegram\\_avviso5.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf)

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.