

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE  
n° 31 del 16 luglio 2026**

**Monitoraggio adulti *Scaphoideus titanus*  
con trappole cromotropiche**

La difesa dalla Flavescenza dorata della vite si basa su due azioni obbligatorie che i viticoltori devono effettuare (Decreto del Direttore del servizio fitosanitario n. 543 del 10 ottobre 2023):

- estirpo tempestivo delle viti con sintomi di giallume della vite, per ridurre le fonti di inoculo nel vigneto;
- trattamento insetticida con prodotti abbattenti secondo le indicazioni riportate nel bollettino di ERSa n. 24 del 18 giugno 2026, per abbattere le popolazioni della cicalina vettrice *Scaphoideus titanus* (scafoideo).

La verifica dell'efficacia del trattamento insetticida risulta fondamentale per le aziende per capire se stanno operando correttamente nell'applicazione degli stessi nei propri appezzamenti.

Tale verifica si effettua posizionando nei vigneti trappole cromotropiche gialle per monitorare gli adulti dello scafoideo.

Il momento migliore per applicare le trappole nei vigneti va da una settimana dopo il trattamento fino a fine luglio. La durata dell'esposizione deve essere di 2 settimane.

Si consiglia l'applicazione di almeno due trappole per azienda/vigneto una verso il bordo dell'appezzamento (dal 2° al 4° filare) e una verso il centro. Per la postazione verso il bordo si suggerisce il lato dove eventualmente ci siano situazioni di rischio (vigneti al confine con presenza elevata di viti con sintomi di giallumi, siepi con presenza di viti inselvatichite, vigneti abbandonati, ecc.). Nel momento del posizionamento segnare con nastro colorato sia il filare sia la vite lungo il filare dove viene installata la trappola per agevolarne il ritrovamento alla fine del periodo di esposizione.

Sul mercato sono disponibili diversi modelli di trappole cromotropiche gialle.

Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti modelli:

- trappole cromotropiche Glutor gialle della ditta Biogard;
- trappole cromotropiche gialle Goldentrap della ditta Gea.

Queste vengono utilizzate anche dal Servizio Fitosanitario per i controlli ufficiali sul territorio in quanto dopo diversi anni di test sono risultate le più affidabili (fig. 1).



Figura 1: modelli di trappole consigliate per monitoraggi adulti scafoideo

Si fa presente che le trappole Glutor gialle vengono commercializzate in confezioni da 20 fogli premarcati e invischiati su entrambe i lati dai quali si ottengono 76 trappole (da 10 x 25cm). Le Goldentrap invece vengono vendute in buste da 10 trappole e presentano entrambe i lati invischiati protetti da una pellicola.

Perché risultino efficaci, nell'attrarre gli adulti della cicalina, le trappole vanno inserite all'interno della parete vegetativa delle viti secondo gli esempi sotto riportati (foto 1 e 2), assicurandosi che la trappola sia libera da foglie che possono coprirla su entrambe i lati del filare.



Foto 1: Posizionamento trappola corretto su viti allevate a Guyot.



Foto 2: Posizionamento trappola corretto su viti allevate a Sylvoz.

Le trappole non vanno posizionate in corrispondenza di spazi liberi dovuti a fallanze in quanto risultano meno efficienti.

La rimozione delle trappole va effettuata dopo due settimane dall'installazione.

Il controllo delle catture può essere fatto sia in campo al momento della rimozione valutando la presenza degli adulti sui fondi collosi (foto 3), sia in un secondo momento portando la trappola a far visionare da personale in grado di riconoscere la cicalina. In questo secondo caso la trappola rimossa dal vigneto va protetta con un foglio di Nylon trasparente o pellicola e, se non visionata lo stesso giorno dell'asportazione, va posta in frigo per evitare la degradazione rapida degli insetti.



Foto 3 Adulto di scafoideo ingrandito catturato su trappola cromotropica (dimensione adulto 5-6mm)

Qualora le aziende abbiano difficoltà a reperire personale in grado di riconoscere la cicalina (es. consulenti, tecnici delle Cantine, tecnici dei Consorzi DOC, ecc.) può rivolgersi al Servizio fitosanitario ai seguenti recapiti:

- Sandro Bressan 3357036242;
- Pierbruno Mutton 3389385518;

per concordare un appuntamento per la visione delle trappole.