



CONSORZIO TUTELA VINI DOC FRIULI ISONZO

SERVIZIO DI DIFESA INTEGRATA IN VITICOLTURA

AVVERTIMENTO N° 1 del 10/04/2012

Situazione meteorologica

Data	Cormons	Fogliano	Fossalon	Giassico	Gorizia	Gradisca	Mariano	S.Pier
01/04/2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02/04/2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03/04/2011	3.2	3.2	1.4	3.6	3.2	3.3	3.8	2.9
04/04/2011	8.6	16.8	5.7	9.8	24.8	10.5	6.2	13.1
05/04/2011	36.4	39.8	11.3	25.6	16.0	34.1	37.4	15.5
06/04/2012	23.3	9.7	6.1	20.8	32.4	9.3	9.3	10.3
07/04/2012	26.9	20.8	4.9	34.0	19.6	20.8	20.8	20.8
08/04/2012	0.1	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
09/04/2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totale	98.5	90.4	31.0	94.0	96.0	78.1	77.6	62.7

dati piovosità (mm pioggia) n.p.: dato non pervenuto

PREVISIONI DEL TEMPO: Mercoledì sulla regione arriverà un fronte freddo atlantico, preceduto da correnti sciroccali; giovedì seguiranno correnti sud-occidentali decisamente meno umide ed instabili. *Fonte Arpa-Osmer.*

Situazione fenologica

Varietà	Sottozona	Descrizione	Fase BBCH	Rispetto al 2011
Chardonnay	Rive Alte	Il germoglio si apre	9-10	3-4 gg anticipo
Tocai friulano	Rive Alte	Cotone rigonfiato, si inizia a intravedere il germoglio	6	3-4 gg anticipo
Merlot	Rive Alte	Cotone rigonfiato, si inizia a intravedere il germoglio	6	In linea
Chardonnay	Rive di Giare	Il germoglio si apre	9-10	3-4 gg anticipo
Tocai friulano	Rive di Giare	Cotone rigonfiato, si inizia a intravedere il germoglio	6	3-4 gg anticipo
Merlot	Rive di Giare	Cotone rigonfiato, si inizia a intravedere il germoglio	6	In linea

Rilievo del 10 aprile 2011

SVILUPPO VEGETATIVO: L'attuale sviluppo vegetativo dei vitigni coltivati nell'area della DOC ISONZO conferma che la fase fenologica del germogliamento è leggermente in anticipo rispetto al 2011. Il germogliamento risulta irregolare.



ESCORIOSI (*Phomopsis viticola*)

L' Escoriosi è una malattia fungina favorita da prolungati periodi di bagnatura e temperature elevate; questo fungo attacca principalmente germogli erbacei e tralci legnosi di un anno, determinando la presenza di aree decolorate, localizzate soprattutto in corrispondenza dei primi nodi e con evidenti fessurazioni presenti lungo gli internodi. Le varietà sensibili sono: Chardonnay, Pinot grigio e Malvasia.

SITUAZIONE GENERALE: nel 2011 non si sono verificati grossi danni da *Phomopsis viticola*, favoriti soprattutto dalle mancate condizioni meteorologiche.

STRATEGIE DI DIFESA: è consigliabile un trattamento specifico, entro la fine della prossima settimana, limitatamente alle varietà sensibili e precoci (Chardonnay, Pinot grigio, Pinot Bianco), e nei vigneti colpiti dall'escoriosi nel 2011 che presentano lo stadio fenologico di punta verde – uscita foglie. Il primo intervento va effettuato a gemma schiusa con al massimo 1-3 cm di sviluppo e solo in casi di maggiore presenza del fungo, il secondo trattamento va ripetuto a distanza di una settimana, con germogli di 4-5 cm.

DA RICORDARE:

1. i tralci colpiti vanno asportati dal vigneto;
2. le lavorazioni a verde favoriscono una buona circolazione dell'aria ed evitano ristagni di umidità;
3. l'eccessiva concimazione azotata favorisce lo sviluppo vegetativo della pianta, favorendo così la diffusione del fungo;
4. i trattamenti contro peronospora, oidio e marciume nero esplicano un'azione collaterale nei confronti dell'escoriosi.

TIGNOLE DELLA VITE

SITUAZIONE GENERALE: in data 30 marzo sono state installate le trappole per il monitoraggio dei voli.

Lobesia botrana: il rilievo del 02 aprile ha segnalato l'inizio dei voli in zona Cormons, Romans d'Isonzo e Rive di Giare.

Il rilievo del 06 aprile ha confermato l'inizio dei voli, anche in zona Farra e Gradisca d'Isonzo.

Eupoecilia ambiguella: Non si segnalano catture.

CONFUSIONE SESSUALE: si ricorda che al più presto vanno posizionati i diffusori per la confusione sessuale, ISONET L PLUS della Shin-Etzu, venduti da Agrochimica friulana.

La distribuzione deve avvenire secondo la densità d'impianto (vedi tabella sottostante), cercando di rinforzare i bordi esterni negli appezzamenti che non confinano con altri vigneti in confusione sessuale, raddoppiando la densità.

N° CEPPI/ETTARO	INSTALLAZIONE
tra 2500 a 3000	1 diffusore ogni 5 ceppi
tra 3000 a 3500	1 diffusore ogni 6 ceppi
tra 3500 a 4000	1 diffusore ogni 7 ceppi
tra 4000 a 4500	1 diffusore ogni 8 ceppi
tra 4500 a 5000	1 diffusore ogni 9 ceppi
tra 5000 a 5500	1 diffusore ogni 10 ceppi
tra 5500 a 6000	1 diffusore ogni 11 ceppi
tra 6000 a 6500	1 diffusore ogni 12 ceppi



COCCINIGLIE

- **Cocciniglia del corniolo (*Parthenolecanium corni*)**

OSSERVAZIONI IN CAMPO: in questa settimana si sono osservati diversi vigneti di Chardonnay in cui è stata rilevata la presenza di alcune forme giovanili svernanti alla base del tralcio, ma non sono state individuate femmine adulte o in procinto di ovideposizione.

Per controlli e strategie di lotta contattate i tecnici del Consorzio.

N.B.: Le sostanze attive indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni riportate nelle **NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA EMANATE DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il documento pubblicato sul sito dell'ERSA all'indirizzo: <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/avviso-homepage/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinari-di-produzione-integrata-anno-2012>.

Per informazioni o richieste di sopralluoghi contattare il tecnico **CORBATTO MONICA** telefonando ai numeri: 0481 61833 ufficio - 340-5050014, oppure inviare una mail all'indirizzo assistentatecnica@vinidocisonzo.it.