

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO *Scaphoideus titanus* VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Comunicazione n. 03 del 05/06/2024

Situazione

Dai monitoraggi effettuati sul territorio regionale, all'inizio di questa settimana in tutte le località sono stati riscontrate le neanidi di 2^a età. In una località sono stati rilevati i primi individui di 3^a età. Nelle tabelle seguenti vengono indicate le percentuali delle diverse età giovanili di *Scaphoideus titanus* osservate nei siti di monitoraggio.

BAGNARIA ARSA (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
09/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2024	98.08	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2024	82.56	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00

SEDEGLIANO (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
09/05/2024	-	-	-	-	-	-
14/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2024	89.47	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

SGONICO (TS)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
09/05/2024	-	-	-	-	-	-
14/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2024	98.87	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2024	82.89	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00

CORNO DI ROSAZZO (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
14/05/2024	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2024	96.61	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2024	91.55	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2024	69.88	25.30	4.82	0.00	0.00	0.00

Indicazioni per i trattamenti

Dalle osservazioni sulla fenologia dell'insetto, e precisamente sulla percentuale stimata dei diversi stadi giovanili nelle popolazioni, si possono trarre indicazioni utili per il posizionamento degli interventi insetticidi.

Dai rilievi finora effettuati **ad oggi si riscontra un andamento leggermente in anticipo rispetto a quello dello scorso anno.**

Per quanto riguarda le indicazioni di lotta, **l'intervento obbligatorio verrà programmato** nel periodo in cui vengono utilizzati i prodotti ad azione abbattente, quindi **orientativamente verso fine giugno.**

Gli interventi accessori, obbligatori in agricoltura biologica, vanno posizionati in anticipo, per colpire i primi stadi giovanili, più sensibili nei confronti delle sostanze ad azione insetticida.

Si ricorda inoltre **l'obbligo di eseguire sempre lo sfalcio della vegetazione spontanea prima dell'impiego di prodotti insetticidi**, per salvaguardare le api e gli altri pronubi.