

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA****BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA OLIVO
n° 3 del 5 giugno 2015****INFORMAZIONI GENERALI**

✂ Le indicazioni fornite nel presente bollettino riguardano la gestione dell'oliveto con il metodo biologico, ed in particolare la difesa dalle principali avversità dell'olivo.

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Per la prossima settimana si avranno ancora condizioni di cielo sereno o velato con possibili episodi temporaleschi. Le temperature massime permarranno alte, tra i 28 e i 30 °C.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

Pendolino - Tricesimo (UD)

**FENOLOGIA**

Lo sviluppo fenologico prevalente in tutti i comprensori olivicoli è la piena fioritura. Solo nelle zone più fresche siamo ad inizio fioritura con pochi fiori aperti, soprattutto sulle cultivar tardive. L'assenza di piogge non ostacola la fecondazione.



Leccino – Pozzuolo del F. (UD)

SITUAZIONE FITOSANITARIA**TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)**

Le catture sono in netto calo in provincia di Trieste, dove il picco dei voli è stato raggiunto la scorsa settimana (vedi tabella 1). Sul restante territorio regionale le catture permangono basse.

DISSECCAMENTI DELLA CHIOMA

Chi notasse sui propri olivi dei disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, soprattutto a carico di giovani piante, può rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

STRATEGIE DI DIFESA**TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)**

Le larve della generazione antofaga, che si sviluppano sui fiori, sono soggette a numerosi fattori di limitazione che ne riducono le popolazioni, tra cui le temperature molto alte di questi giorni.

Solo in caso di forti infestazioni a carico dei fiori si consiglia di intervenire con *Bacillus thuringiensis* al superamento della soglia d'intervento del 40-45% di fiori infestati.

GESTIONE DELLA COLTURA

Si consigliano sfalci del manto erboso sotto chioma per ridurre la competizione idrica vista l'assenza di precipitazioni.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
			18-22 mag	25-29 mag	01-05 giu						
UD	Caneva	Stevenà	/	0	1						
UD	Tricesimo	Leonacco	/	5	0						
UD	Moimacco	Bottenicco	19	3	1						
UD	Faedis	Campeglio	2	0	0						
GO	Sagrado	Castelnuovo	2	0	1						
GO	Cormons	Quarin	13	36	2						
GO	San Floriano	Giasbana	11	23	5						
GO	Gorizia	Oslavia	7	6	1						
TS	Duino Aurisina	Slivia	24	28	3						
TS	Duino Aurisina	S.Croce	37	50	12						
TS	Trieste	Costalunga	48	152	14						
TS	San Dorligo	Caresana	21	70	1						
TS	San Dorligo	Bagnoli	32	97	2						
TS	Muggia	S.Barbara	27	65	7						
TS	Muggia	Chiampore	34	83	9						

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN tel. 0432 5293270 cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021