


BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA OLIVO n° 2 del 31 marzo 2020

Speciale Potatura

La potatura dell'olivo, oltre ad accrescere la produzione, migliorare sensibilmente la qualità e la distribuzione dei trattamenti fitosanitari, mira anche a migliorare la forma della pianta che naturalmente tende a crescere in maniera eccessiva e disordinata con una chioma che tende verso l'esterno diventando simile a un cespuglio. Questa irregolarità sottrae anche la luce ai rami più produttivi danneggiandone la resa in termine di fruttificazione.

La forma di allevamento caldeggiata per in nostri areali è quella a **vaso policonico** in quanto, alle nostre latitudini, permette il miglior irraggiamento della chioma ed inoltre:

- rispetta la fisiologia della pianta garantendo un buon equilibrio vegeto-produttivo
- la potatura negli anni successivi è facilitata
- la raccolta e i trattamenti sono facilitati



Per una corretta potatura è importante ricordare alcune regole fondamentali:

- individuare le 3 – 4 branche principali con una inclinazione di 45 gradi circa;
- eliminare a raso i rami dorsali delle branche principali svuotando la parte centrale della chioma;
- individuare l'apice vegetativo della branca alleggerendolo nella parte interna ed eliminando i competitori.

Mantenendo i principi sopra elencati dovremo interpretare la potatura in base alle esigenze delle singole piante tenendo in considerazione in particolare la varietà, la vigoria, il portamento e la densità della chioma.



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

REVISIONE EUROPEA DEL RAME

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a **28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni** (mediamente **4 kg all'anno/ettaro**).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Occhio di Pavone

Dai monitoraggi effettuati non appaiono attualmente nuove infezioni di occhio di pavone. La cascola di foglie presente specialmente sulla varietà bianchera è da attribuire alle persistenti piogge autunnali che hanno creato un ambiente molto favorevole al fungo.

Cimice asiatica

Le temperature di metà marzo hanno riattivato gli adulti svernanti di *Halyomorpha halys* e in questi giorni si è iniziata la posa delle trappole di monitoraggio.

STRATEGIE DI DIFESA

Al termine delle operazioni di potatura è consigliabile effettuare un trattamento a base di rame prediligendo formulati a maggiore resistenza al dilavamento. Il rame in questa fase oltre ad esplicare un efficace azione fungicida favorisce la disinfezione e la cicatrizzazione dei tagli di potatura.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura
UD-GO-PN cell. 3346564262; 3389385559
TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021