



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Biologica n° 03 del 18/04/2024

Andamento meteo

Il fronte freddo che ha colpito tutta la regione nella giornata di martedì permarrà fino alla giornata di sabato soprattutto grazie ai venti di bora che manterranno basse le temperature.

Fenologia

Nell' areale di San Dorligo della Valle, Muggia, Trieste, Caneva, Cormons:

La varietà **Bianchera**: è di formazione delle mignole

La varietà **Leccino**: è di formazione delle mignole

Negli altri areali

La varietà **Bianchera**: è di inizio formazione delle mignole

La varietà **Leccino**: è di allungamento del germoglio

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**



Foto: foglie molto colpite da occhio di pavone “irrecuperabili”



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.

c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Foto: Ingiallimento fogliare dovuto a forte attacco di occhio di Pavone



Foto: Olivi gravemente colpiti da Occhio di pavone



Foto: defogliazione totale su rami bassi varietà Bianchera



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Le temperature miti, tipiche della primavera con alti tassi di umidità e frequenti piogge, hanno aumentato in modo esponenziale l'infestazione fungina che già all'origine si era creata nel periodo autunnale con le svariate piogge di ottobre per poi proseguire nell'inverno mite di quest'anno.

Il danno risulta più marcato: nelle zone storicamente più umide, (vicino al bosco o con ristagno di umidità) dove non sono stati eseguiti i trattamenti post raccolta su olivi non potati, su varietà sensibili quali Ascolana, Bianchera, Frantoio, Buga.

Difesa: in caso di infestazione si consiglia l'intervento con prodotti a base di rame (Poltiglia Bordolese) assieme a zolfo adesivato o con ossido di rame per far cadere le foglie infette e proteggere le nuove foglie.

Al link sottostante si allega la prova eseguita da ERSA sull'efficacia di diversi formulati rameici per la lotta all'occhio di pavone.

https://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/informazione/notiziario/allegati/2023/3/03_Risultati-attivita-sperimentale.pdf

Servizio tecnico 3389176435 - 3405563626