

Bollettino Difesa Biologica n° 06 del 22/05/2025

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Nella giornata di giovedì sera / venerdì mattina è previsto il passaggio di una perturbazione a carattere piovoso, poi venti di bora moderata permarranno fino a domenica.

Fenologia

Nell' areale di San Dorligo della Valle, Muggia, Trieste

La varietà **Bianchera**: fioritura

La varietà **Leccino**: inizio fioritura

Nell' areale carso

La varietà **Bianchera**: sviluppo delle mignole

La varietà **Leccino**: sviluppo delle mignole

Nell' areale goriziano

La varietà **Bianchera**: inizio fioritura

La varietà **Leccino**: sviluppo delle mignole



Foto: fioritura Bianchera zona San Dorligo

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Prosegue il clima idoneo allo sviluppo del fungo.

Difesa: Visto l' inizio della fioritura **non si consigliano trattamenti.**

Insetti:

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Dalle trappole di monitoraggio si nota l' aumento della presenza dell' insetto il quale si sta spostando nell' oliveto per iniziare l' accoppiamento e poi ovideporre, attualmente è stato rallentato dalle condizioni meteo.



Foto: catture di Cimici asiatiche

Difesa: in zone dove si rilevano visivamente più insetti e **dove non ha ancora fiorito** è consigliato l' intervento repellente con caolino/zeolite per evitare l' aggregazione e quindi l' accoppiamento soprattutto su varietà sensibili quali Leccino, Maurino.

- **Margaronia (*Palpita Unionalis*)**

Non si evidenziano catture del lepidottero.

- **Mosca dell'olivo (*B. oleae*)**

Si consiglia l'installazione della trappole di cattura massale (con durata 6 mesi) per contrastare in maniera preventiva il parassita e catturare la generazione svernante.



Foto: esempi di trappole per il mass trapping con durata 6 mesi

- **Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)**

Le catture del lepidottero risultano di trascurabile o nulla entità, la generazione attuale è quella antofaga cioè quella che ovidepone sulle mignole provocando rosure ai boccioli fiorali

Difesa: non sono consigliati trattamenti



Foto: catture tignola zona Aquilinia

- **Acaro Eriofide dell'olivo (*Aceria Oleae*)**

Viene rilevato, in alcune locations tramite esame visivo del danno e poi tramite microscopio, la presenza sulle mignole dell'acaro dell'olivo, questo parassita che è lungo meno di 2mm, se in presenza abbondante provoca disseccamento e cascola prematura delle mignole.



Foto: acari eriofidi presenti su mignola



Foto: acari eriofidi presenti su mignola 2025



Foto: acari devitalizzati post trattamento



Foto: Danni da acari eriofide 2024

Difesa: prodotti a base di zolfo o sapone molle effettuano un'azione abbattente sul parassita da applicare in modo preventivo prima della scamicatura del fiore.

SI RICORDA CHE IN FIORITURA NON BISOGNA ESEGUIRE TRATTAMENTI

Servizio tecnico 3389176435 – 3405563626