

Bollettino **Difesa Biologica** n° 14 del 17/07/2025

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Clima sereno e soleggiato con temperature al di sotto della media.

Fenologia

Nelle zone di Muggia – Aquilinia

la fase fenologica prevalente è di:

- varietà **Bianchera**: Secondo accrescimento
- varietà **Leccino**: indurimento del nocciolo

Nelle zone di Gorizia – San Dorligo della Valle

e Trieste

la fase fenologica prevalente è di:

- varietà **Bianchera**: indurimento del nocciolo
- varietà **Leccino**: pre- indurimento del nocciolo



Foto: indurimento nocciolo Bianchera zona Sagrado

Malattie funginee

● Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)

Il clima non è idoneo allo sviluppo del fungo.

Difesa: non sono consigliati interventi.

Insetti:

Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)

Le catture settimanali risultano di bassa entità

Difesa: non sono consigliati interventi.

● Margaronia (Palpita Unionalis)

Rilievi settimanali con catture in calo in tutti i comprensori, iniziano a farsi evidenti le rosure sulle olivine.



Foto: adulto Margaronia e larva



Foto: danno su oliva

Difesa: date le esigue catture non sono necessari interventi

● Mosca dell'olivo (B. oleae)

Vengono rilevate molte catture del dittero dislocate in diverse zone (vedi tabella)



Foto: Femmina di Mosca dell' olivo



Foto: Maschio di Mosca dell' olivo



Foto: punture di Bactrocera Oleae



Foto: Ovatura di Bactrocera Oleae

Foto: larva di prima età di Bactrocera Oleae

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca	% INFESTAZIONE ATTIVA
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	2	0
GO	Sagrado	Sagrado	10	0
GO	Ronchi	Selz	6	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	6	5
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	4	0
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	1	0
TS	San Dorligo	Montedoro	10	0
TS	San Dorligo	Caresana	9	0
TS	Muggia	Aquilinia	11	0
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	7	1

Tabella : catture e infestazione settimanale Bactrocera Oleae

Difesa: Le temperature sono idonee allo sviluppo dell' insetto, in alcune zone l' infestazione attiva risulta inizialmente elevata con diverse ovature e larve di prima età.

Al fine di evitare che questa generazione (la prima) inizi da subito ad essere elevata, si consiglia di contattare il tecnico di zona per definire una strategia di contenimento adeguata tra quelle ammesse:

- l' utilizzo di polveri di roccia (Caolino/Zeolite ecc.) : **repellenti alle ovideposizioni,**
- strategia attract & kill utilizzando prodotti a base Spinosad : **abbassa la quantità di adulti presenti**
- strategia abbattente utilizzando prodotti a base Piretro : **abbassa la quantità di adulti presenti (attenzione ha anche effetti secondari negativi)**

Si ricorda che nell' applicazione delle polveri di roccia, è consigliato l' aggiunta di un bagnante ed un adesivante, il primo permette l' applicazione uniforme del prodotto sulla drupa, il secondo evita eventuali dilavamenti da piogge.

● **Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)**

Non si rilevano catture.

Difesa: Non sono necessari trattamenti.



Foto: galleria su drupa di Tignola

● ***Cecidomia suggisorza dell'olivo (Resseliella oleisuga)***

Questo insetto causa la rottura dei giovani rametti a frutto, il quale ovideponendo sotto la corteccia ne compromette la struttura, la cecidomia compie da 4 a 5 generazioni l'anno. In caso di forte infestazione può compromettere la produzione di olive dell'anno successivo.



Foto: larve di Cecidomia suggisorza



Foto: Olivo fortemente colpito da Suggisorza

Difesa: Asportare e bruciare ove possibile i rametti colpiti per ridurre l'infestazione.

Servizio tecnico Tergeste Dop: Riggi 3389176435 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersa: Stocco 3346564262 – Gori 3389385559