

Bollettino Difesa Biologica n° 17 del 07/08/2025

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Settimana con tempo soleggiato e stabile e temperature in veloce aumento grazie all' arrivo dell' alta pressione di matrice subtropicale.

Fenologia



Foto: Bianchera zona Muggia

In tutte le zone la fase fenologica prevalente è di:

- varietà **Bianchera**: Secondo accrescimento
- varietà **Leccino**: Secondo accrescimento

Malattie funginee

● **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Gli abbassamenti termici e l'umidità elevata hanno dato avvio alle prime infezioni funginee.



Foto: inizio formazione funginea da *spilocaea oleaginea*

Difesa: al fine di contenere la proliferazione del patogeno si consiglia un intervento con poltiglia bordolese o con fosfonato di potassio.

Insetti:

● **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

In questa settimana l'insetto ha ripreso la sua attività dando origine alla sua seconda ed ultima generazione, infatti si rilevano ovature e neanidi di prima età.



Foto: adulto di cimice marmorata asiatica



Foto: neanidi appena nate di cimice marmorata asiatica

consorzio olio – konzorcij olja
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

Difesa: visto la fase fenologica di indurimento del nocciolo, l' insetto non provoca più danni da cascola alle olive ma solo deformazioni quindi non sono consigliati interventi.

● Margaronia (Palpita Unionalis)

Continua l' attività del lepidottero, le trappole di monitoraggio fanno registrare diverse catture in tutte le aree soggette a controllo, in questa fase si vedono diversi danni alle olive con rosure di una parte dell' oliva, attualmente il danno cagionato è di tipo quantitativo riducendo il peso delle drupe.

Difesa: Viste le diverse catture e in presenza di rosure in tutte le zone viene consigliato un trattamento a base di *Baccillus Thuringensis* var. *Kurstaki*



Foto: catture di Margaronia



Foto: danni di margaronia su olive

● Mosca dell'olivo (*B. oleae*)

In alcune zone è incominciata la seconda generazione di Mosca Olearia con lievi incrementi di catture (vedi tabella) tuttavia si prevede uno sfarfallamento più consistente tra questo week end e l'inizio della prossima settimana.



Foto: doppi fori di uscita della mosca olearia su Bianchera zona Muggia

Comune	Località	n° catture mosca 28° settimana	n° catture mosca 29° settimana	n° catture mosca 30° settimana	n° catture mosca 31° settimana	n° catture mosca 32° settimana
San Floriano del Collio	Valerisce	0	2	2	0	0
Sagrado	Sagrado	2	10	12	12	5
Ronchi	Selz	3	6	9	4	7
Duino Aurisina	Sgonico	0	6	5	1	2
San Dorligo	Montecelo Nord	1	4	5	10	5
San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0	1	7	2	1
San Dorligo	Montedoro	1	10	8	6	0
San Dorligo	Caresana	0	9	13	3	10
Muggia	Aquilinia	2	11	10	3	11
Muggia	Darsella S. Bartolomeo	0	7	3	6	1

Tabella : catture settimanali Bactrocera Oleae

Prov.	Comune	Località	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
GO	Sagrado	Sagrado	1	1	4	0	3	0	2	0	2	0	0	8
GO	Ronchi	Selz	3	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	2
TS	Duino Aurisina	Sgonico	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	3	2	0	5	2	0	1	0	1	0	1	4
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montedoro	1	1	0	6	2	0	3	0	7	0	1	3
TS	San Dorligo	Caresana	1	2	3	1	2	0	3	0	1	0	1	7
TS	Muggia	Aquilinia	2	0	0	8	2	1	2	0	1	0	1	2
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	1	1	3	0	2	0	2	0	6	0	3	6

Tabella : infestazione settimanale Bactrocera Oleae

Difesa: Le temperature continuano ad essere molto favorevoli allo sviluppo dell' insetto il quale ha a disposizione un buon lasso temporale per ovideporre, in tutte le zone l' infestazione attiva risulta elevata con diverse ovature, larve di prima età, larve di seconda età, larve di terza età e pupe.

Al fine di evitare che la seconda generazione incominci ad ovideporre, si consiglia di contattare il tecnico di zona per definire una strategia di contenimento adeguata tra quelle ammesse:

- l' utilizzo di polveri di roccia (Caolino/Zeolite ecc.) : **repellenti alle ovideposizioni, da applicare post pioggia**
- strategia attract & kill utilizzando prodotti a base Spinosad : **abbassa la quantità di adulti presenti, da applicare post pioggia**
- strategia abbattente utilizzando prodotti a base Piretro : **abbassa la quantità di adulti presenti (attenzione ha anche effetti secondari negativi)**

Si ricorda che nell' applicazione delle polveri di roccia, è consigliato l' aggiunta di un bagnante ed un adesivante, il primo permette l' applicazione uniforme del prodotto sulla drupa, il secondo evita eventuali dilavamenti da piogge.

Concimazione fogliare

Vista la fase fenologica di secondo accrescimento e per consentire un miglior assorbimento dei nutrienti e agevolare l' ingrossamento del frutto è consigliata l' applicazione fogliare di alghe brune.

Si ricorda che ogni intervento di concimazione va giustificato da necessità o carenza secondo normativa vigente.

Gestione agronomica



Foto: Potatura verde

In questo periodo è opportuno iniziare le operazioni di potatura verde con rimozione dei polloni basali e dei succhioni, si consiglia la cippatura dei residui vegetali su piccoli appezzamenti, su grandi appezzamenti è consigliato il posizionamento del materiale tra le file per successiva trinciatura assieme allo sfalcio di pre-raccolta.

Questa operazione è molto importante soprattutto su olivi riformati e per indirizzare le risorse della pianta su vegetazione utile a formare nuovi rami produttivi.



Foto: succhioni su olivo



Foto: polloni su olivo

Servizio tecnico Tergeste Dop: Riggi 3389176435 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersas: Stocco 3346564262 – Gori 3389385559