


BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA OLIVO n° 16 del 30 settembre 2022

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Con sabato 1 ottobre condizioni meteo in miglioramento con cielo in prevalenza variabile sulla zona montana e la costa, poco nuvoloso in pianura; temperature in leggero aumento. Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrataobbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

Continua la fase di secondo accrescimento del frutto; continua l'invaiaura di Leccino e Pendolino.



Mosca in ovideposizione su Bianchera a Moruzzo



Danni da grandine

DANNI DA GRANDINE

In diverse località specie della pedemontana udinese si sono avuti eventi grandinigeni anche di intensità importante; si raccomanda se ci sono ferite di effettuare un trattamento rameico per evitare l'insorgere di altre patologie come la rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*) stando attenti a valutare il periodo di carenza e tenendo conto della presunta data di raccolta.

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

Dai monitoraggi in particolare nella varietà Bianchera si evidenzia che sono ripartite le infezioni del fungo che iniziano ad essere visibili con i primi ingiallimenti delle foglie e le classiche macchie a forma di occhio di pavone; le condizioni meteo climatiche sono molto favorevoli al fungo.

Mosca delle olive (*Dacus oleae*)

Il repentino abbassamento termico sta rallentando l'attività dell'insetto con catture (Tabella 1) tendenzialmente in calo in diverse località; infestazioni attive (Tabella 2) più alte in particolare nella zona di Muggia.

Tabella 1 catture di mosca

PROV.	Comune	Località	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
PN	Caneva	Stevenà	0	0	9	0	5	0	1	1	1	0	1	2	3	4
PN	Caneva	Demarco	1	1	4	0	3	3	0	0	1	1	2	0	4	0
PN	Caneva	Fiaschetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PN	Pinzano		0	3	1	1	0	1	0	0	3	2	2	5	9	12
UD	Ragogna	Villuzza	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	12	3
UD	Osoppo		1	0	0	0	5	1	0	0	0	4	6	1	3	5
UD	Tricesimo	Adornano	9	2	0	2	1	6	0	1	0	4	12	20	12	10
UD	Povoletto	Salt	-	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UD	Gemona	Taboga	-	-	3	3	0	0	0	4	0	-	5	0	2	0
UD	Rodeano	Coseanetto	0	1	1	1	1	1	1	0	0	4	9	4	3	1
UD	Cividale	Spessa Bio	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
UD	Cividale		-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
UD	Castions di Strada		-	0	1	0	0	2	0	0	0	2	1	8	3	4
UD	Gonars	Fauglis	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
GO	Sagrado		-	0	1	-	0	0	-	-	0	0	0	0	2	1
GO	Ronchi	Selz	-	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	8	13	0
TS	Duino	Medeazza	-	0	3	-	5	0	0	0	0	0	4	3	0	0
TS	Sgonico	Sgonico	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Trieste	Contovello	-	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
TS	Trieste	Campanelle	-	0	1	2	1	0	1	2	1	2	3	5	7	4
TS	San Dorligo	Bagnoli	-	0	2	2	0	0	1	0	1	0	5	4	6	2
TS	San Dorligo	San Giuseppe	-	0	1	1	0	1	0	0	1	1	2	3	5	4
TS	San Dorligo	Dolga Krona	-	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	3	17	11
TS	San Dorligo	Montedoro	-	1	11	11	5	2	2	9	26	6	6	20	17	13
TS	San Dorligo	Caresana	-	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	11	6
TS	Muggia	S.Barbara	-	0	2	1	1	0	0	2	1	4	16	19	30	5
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	-	4	5	2	0	1	1	3	6	15	54	25	44	7

Tabella 2. Mosca olearia, percentuale di infestazione attiva

Prov	Comune	Località	Punture	Uova	Larve vive 1.	Larve morte	Larve vive 2.	Larve morte	Larve vive 3.	Larve morte	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	%INFESTAZIONE ATTIVA	%INFESTAZIONE DANNOSA	%INFESTAZIONE TOTALE
UD	Cividale	Spessa	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	3
UD	Cividale	Cividale	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	3
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	2	2	4
UD	Gonars	Fauglis	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	4
GO	Sagrado	Sagrado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GO	Ronchi	Selz	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	4	5
TS	Duino Aurisina	Slivia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
TS	Trieste	Contovello	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2
TS	Trieste	Campanelle	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	3	5	8
TS	San Dorligo	Bagnoli	1	0	1	0	1	0	3	0	2	0	1	2	6	8
TS	San Dorligo	San Giuseppe	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	1	5	6
TS	San Dorligo	Dolga Krona	3	2	1	0	2	0	5	0	4	0	7	5	1	2
TS	San Dorligo	Montedoro	0	0	1	4	1	3	2	0	1	0	3	2	6	8
TS	San Dorligo	Caresana	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	2	3	3	6
TS	Muggia	S.Barbara	1	0	2	0	3	0	4	0	3	0	5	5	12	17
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	1	1	2	6	3	2	4	1	2	0	4	6	11	17

STRATEGIE DI DIFESA

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

Le piogge tra il 24 e il 26 settembre sono state particolarmente dilavanti (in molte zone si sono superati i 100 mm) per cui si raccomanda specie per le varietà più sensibili di ripristinare la copertura con un trattamento a base di rame da effettuarsi subito dopo le piogge tenendo conto in ogni caso del periodo di carenza indicato in etichetta (considerato l'avvicinarsi del momento della raccolta).

Mosca dell'olivo

Dove ci sia presenza importante di catture e dove si prevede una raccolta tardiva si consiglia di ripetere il trattamento dopo le piogge (indicativamente a partire da sabato 1 ottobre) con l'**esca adulticida a base Spinosad in particolare**

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

cell. 3346564262; 3389385559