



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Biologica n° 06 del 30/05/2024

Andamento meteo

Si prevedono abbondanti precipitazioni nella giornata di venerdì, per il week end si prevede tempo stabile.

Fenologia

Gli olivi presentano la fase fenologica di:

Nell' areale di San Dorligo della Valle, Muggia, Trieste, Caneva, Cormons:

Bianchera : allegagione

Leccino: fine fioritura.

Restanti zone:

Bianchera : fine fioritura

Leccino: fioritura



Foto: Allegagione Bianchera zona Muggia



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Malattie funginee

- *Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea)*



Foto: foglie molto colpite da occhio di pavone

Con le frequenti piogge e le temperature idonee allo sviluppo di patologie funginee si consiglia di prestare massima attenzione a nuove infezioni che possono riprendere dopo le precipitazioni.

Difesa: in caso di infestazione si consiglia l'intervento con prodotti a base di rame (Poltiglia Bordolese) assieme a zolfo adesivato dopo la fioritura per far cadere le foglie infette e proteggere le nuove foglie.

SI RICORDA CHE IN FIORITURA NON BISOGNA ESEGUIRE TRATTAMENTI

Insetti:

- *Tignola dell'olivo (Prays oleae)*

Dalle trappole di monitoraggio, le catture del lepidottero, risultano quasi assenti.

Difesa: non occorre effettuare trattamenti



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

- *Margaronia (Palpita Unionalis)*

Attualmente non vengono rilevate catture.

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

Si consiglia l'installazione della trappole di cattura massale (con durata 6 mesi) per contrastare in maniera preventiva il parassita.



Foto: esempi di trappole per il mass trapping con durata 6 mesi



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**



Foto: gruppo di Cimici asiatiche

Le trappole installate e sulle piante si rilevano un aumento della presenza di adulti di cimici in tutte le zone monitorate, inoltre si rilevano i primi accoppiamenti e le prime ovature solitamente deposte nella pagina inferiore della foglia di olivo.

Difesa: In questa fase non sono da effettuare interventi, si ricorda che il danno più rilevante viene causato dalle neanidi della cimice marmorata asiatica, subito dopo la fioritura dell' olivo e fino all' indurimento del nocciolo.

Qualora le piante avessero terminato la fioritura sarebbe opportuno utilizzare prodotti repellenti alle ovideposizioni quali caolino/bentonite con adesivante.

Servizio tecnico 3389176435 - 3405563626