



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Biologica n° 10 del 27/06/2024

Andamento meteo

Tempo sereno leggermente ventilato nel week end, nella settimana entrante si potrebbero verificare rovesci di carattere piovoso localmente anche intensi.

Fenologia

Gli olivi presentano la fase fenologica di:

Bianchera : 1° ingrossamento del frutto

Leccino: 1° ingrossamento del frutto



Foto: Bianchera Zona Muggia

Malattie funginee

- *Piombatura (Pseudocercospora cladosporioides)*

Questa settimana sono stati osservati, in molte locations, parecchie infezioni funginee da Piombatura con evidenti segni di ingiallimenti fogliari e conseguente filloptosi (caduta delle foglie), a differenza dall'occhio di pavone (il quale presenta sulla parte superiore della foglia dei cerchi più o meno grandi), il fungo si presenta con una velatura grigia sulla pagina inferiore della foglia.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Foto: Foglie colpite da Piombatura

Difesa: l' intervento con prodotti a base di rame aiutano a contenere il fungo .

Insetti:

- ***Tignola dell'olivo (Prays oleae)***

Catture in netto calo, l' insetto ha incominciato le ovideposizioni.

Difesa: si consiglia nella zona di Montedoro un trattamento preventivo a base di Bacillus Thuringensis, il trattamento deve essere fatto verso le ore serali per massimizzarne l' effetto.

- ***Margaronia (Palpita Unionalis)***

Viene rilevata la presenza nell' areale di San Dorligo della Valle e nell' udinese.

Difesa: i trattamenti per la Tignola riducono la popolazione dell' insetto



Foto: Margaronia



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

★ Mosca dell'olivo (*B. oleae*)

Si consiglia l'installazione della trappole di cattura massale (con durata 6 mesi) per contrastare in maniera preventiva il parassita.

Vengono rilevati diversi esemplari di mosca olearia sulla lamina inferiore delle foglie di olivo e nelle trappole di cattura, in diversi comprensori della regione.



Prov.	Località	n° catture mosca
PN	Casagrande	1
PN	Stevenà	5
PN	Aviano	1
UD	Rive d' arcano	1
UD	Osoppo	3
UD	Gemona	1
UD	Tricesimo	10
UD	Ragogna	0
UD	Povoletto	1
UD	Pinzano	0
UD	Cividale	0
UD	Castions di Strada	4
UD	Lestizza	0
UD	Latisana	0
GO	Sagrado	0
GO	Selz	0
TS	Silvia	0
TS	Sgonico	0
TS	Campanelle	21
TS	Bagnoli	1
TS	Dolga Krona	1
TS	Montedoro	1
TS	Caresana	0
TS	S.Barbara	1
TS	Darsella S. Bartolomeo	11

Foto: Catture Mosca dell'olivo zona Muggia

Tabella: catture mosca dell'olivo

Nella zona di Trieste sulla varietà Ascolana, nella fase di pre- indurimento del nocciolo oltre a trovare molte punture di ovideposizione sterili è stato rilevato anche un principio di infestazione larvale.

Difesa: si consiglia di utilizzare nei casi in cui è prossima la fase di indurimento del nocciolo prodotti repellenti quali Caolino o Zeolite per evitare le ovideposizioni, si raccomanda l' utilizzo di un' adesivante per evitare che il prodotto venga dilavato.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Dalle trappole installate e dall'analisi visiva sulle piante si rileva un aumento di neanidi di cimice in tutte le zone monitorate.



Foto: Olive colpite da Cimice Asiatica



Foto: Cimice al terzo stadio

Difesa: In questa fase è fortemente consigliato l'uso del caolino/zeolite con adesivante come repellente alle ovideposizioni, va ricordato che basta un'ovatura di cimice presente sull'albero per azzerare la quantità di olive in 7/10 giorni.

Da questo anno è possibile utilizzare il piretro naturale come abbattente nei confronti delle neanidi di cimice asiatica; ovviamente deve essere applicato verso sera per massimizzare l'effetto.

- **Cocciniglia mezzo grano pepe (*Saissetia oleae*)**



Foto: adulti di cocciniglia mezzo grano pepe



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



In diversi comprensori monitorati è stata rilevata la presenza della forma adulta della cocciniglia mezzo grano pepe.

Questo insetto per nutrirsi punge le varie parti della pianta, sottraendo linfa e causando un indebolimento della pianta.

Se non viene trattato adeguatamente, aumenta di numero negli anni e causa una progressiva riduzione della produzione, inoltre secerne una melata che se presente in grande quantità fa sviluppare la fumaggine, tale patologia funginea in casi gravi provoca il deperimento della pianta.

Difesa: Si consiglia di intervenire dopo che ha ovideposto (quando sono schiuse il 70/80% delle uova) con olio bianco o con Sali potassici di acidi grassi così da ridurre la presenza dell' insetto, ripetendo il trattamento dopo altri 15 gg. I prodotti vanno dati verso le ore serali per evitare l'effetto "lente" dovuto al sole.

Viene osservato che l'utilizzo del **caolino/zeolite** per la difesa contro altri insetti aiuta a contrastare anche la Cocciniglia.

Gestione agronomica

Effettuare sfalci e del sotto-chioma per ridurre il ristagno di umidità ed agevolare la crescita del frutto.

Servizio tecnico 3389176435 - 3405563626