

Bollettino **Difesa Biologica** n° 13 del 20/08/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

In arrivo nella serata odierna un fronte temporalesco che permarrà fino a sabato mattina con piogge anche abbondanti

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: inizio invaiatura leccino Muggia



Foto: Inizio invaiatura Frantoio zona San Dorligo

Nella Zona di Muggia

La varietà **Bianchera**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

La varietà **Leccino**: Inizio invaiatura fase fenologica BBCH 81

In tutti gli altri areali

La varietà **Bianchera**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

La varietà **Leccino**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Le temperature elevate e l'assenza di precipitazioni prolungate rallenta molto la crescita funginea.



Foto: Occhio di pavone

Difesa: viste le temperature odierne superiori ai 30°C è sconsigliato l'intervento con rameici, tuttavia con l'arrivo delle piogge e gli abbassamenti termici si prevede la ripresa dell'attività del patogeno quando le condizioni sono idonee, cioè quando la temperatura raggiunge valori tra 12°C e 18°C e la quantità di pioggia supera i quindici millimetri totali che possono cadere in un solo giorno oppure accumularsi in più giorni consecutivi, La pioggia, favorisce il rilascio e la dispersione delle spore nell'ambiente mentre la bagnatura fogliare prolungata e continuativa di almeno sei ore fa sì che germinino le spore del fungo e inizi a penetrare nei tessuti della foglia.

Insetti:

- *Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)*

Sulle piante si rilevano tutti gli stadi dell' insetto, da neanidi ad adulti

Difesa: Non sono consigliati interventi.



Foto: neanide di cimice marmorata asiatica

- *Margaronia (Palpita Unionalis)*

Dal monitoraggio in campo continuano a venir rilevati i danni causati dall' insetto sia nel goriziano che nel triestino con presenza di rosure sulle olive e sugli apici fogliari.




Foto: olive danneggiate da margaronia

Difesa: In casi di media/forte infestazione si consiglia di intervenire preventivamente con *Bacillus Thuringensis* per abbassare la presenza del lepidottero ripetendo dopo 10 giorni il medesimo trattamento, questi interventi dovranno essere eseguiti verso tardo pomeriggio per evitare che risultino inefficaci in quanto il prodotto ha poca durata e l' insetto agisce prevalentemente di notte.

- **Mosca dell'olivo (*Bactrocera Oleae*)**

Le temperature elevate hanno ostacolato l'attività dell'insetto (vedi grafico), tuttavia con le piogge prossime e l'abbassamento del volano termico, ricomincerà nuovamente l'attività dacica avendo più tempo per nutrirsi, accoppiarsi ed ovideporre.



Foto: Mosca olearia




Grafico: attività mosca olearia a Agosto 2026 in base alle temperature zona S. Dorligo della Valle

Nelle zone dove non sono stati eseguiti i trattamenti verso metà luglio è stata riscontrata un infestazione dannosa abbastanza elevata infatti l'insetto viste le temperature basse aveva molta attività (vedi grafico)




Grafico: attività mosca olearia a luglio 2026 in base alle temperature zona S. Dorligo della Valle

Difesa: si consiglia l' intervento con prodotti adulticidi dopo le piogge per ridurre ulteriormente la popolazione dacica.

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	0
GO	Ronchi	Selz	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	1
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0
TS	San Dorligo	Montedoro	0
TS	San Dorligo	Caresana	2
TS	Muggia	Aquilinia	1
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	0

Tabella: catture Bactrocera Oleae

Servizio tecnico Tergeste Dop: Copetti 3382006129 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersa: Gori 3389385559