

Bollettino **Difesa Biologica** n° 15 del 03/09/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Permane clima caldo con temperature minime elevate nel triestino.

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: Carica produttiva Bianchera Montedoro



Foto: Bianchera zona Muggia

In tutti gli areali

La varietà **Bianchera**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

La varietà **Leccino**: Inizio invaiatura fase fenologica BBCH 81

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Incominciano a crearsi le condizioni favorevoli per la proliferazione funginea, l'unico fattore attualmente limitante sono le temperature, le quali devono essere entro i 18° C.



Foto: Occhio di pavone

Difesa: nelle zone con forte umidità, con elevate bagnature, con temperature favorevoli o con infezioni latenti, si consiglia l'intervento con prodotti rameici, come ad esempio la poltiglia bordolese che offre un'azione preventiva ed efficace in zone umide.

Insetti:

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Sulle piante continuano ad essere osservate varie presenze dell'insetto anche a più stadi di sviluppo.

Difesa: Non sono consigliati interventi.



Foto: adulto di cimice marmorata asiatica

- **Margaronia (*Palpita Unionalis*)**

Dal monitoraggio in campo continuano a venir rilevati i danni causati dall' insetto sia nel goriziano che nel triestino con presenza di rosure sulle olive e sugli apici fogliari, nelle trappole di monitoraggio vi comunque un calo delle catture.



Foto: olive danneggiate da margaronia

Difesa: In casi di media/forte infestazione si consiglia di intervenire preventivamente con *Bacillus Thuringensis* per abbassare la presenza del lepidottero ripetendo dopo 10 giorni il medesimo trattamento, questi interventi dovranno essere eseguiti verso tardo pomeriggio per evitare che risultino inefficaci in quanto il prodotto ha poca durata e l' insetto agisce prevalentemente di notte.

- **Mosca dell' olivo (*Bactrocera Oleae*)**

Vengono rilevati in campo diverse punture sulle drupe, soprattutto nelle zone dove non sono stati effettuati interventi adulticidi e che presentano molti esemplari di mosca nelle trappole di monitoraggio. Dal campionamento per verificare l' infestazione attiva in alcune zone sono state rilevate larve di prima età.



Foto: Puntura di ovideposizione della Mosca olearia

Difesa: si consiglia l' intervento con prodotti adalticidi per ridurre ulteriormente la popolazione dacica. L' Utilizzo di polveri di roccia con adesivanti/bagnanti, in queste ultime fasi, permetterà di ostacolare lo sviluppo dell' insetto arrivando alla raccolta con poca o nulla infestazione dannosa.

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	1
GO	Ronchi	Selz	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	1
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0
TS	San Dorligo	Montedoro	0
TS	San Dorligo	Caresana	1
TS	Muggia	Aquilinia	7
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	4

Tabella: catture Bactrocera Oleae

Prov.	Comune	Località	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GO	Sagrado	Sagrado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
GO	Ronchi	Selz	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montedoro	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
TS	San Dorligo	Caresana	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
TS	Muggia	Aquilinia	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	6	1
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	5	1

Tabella: infestazione Bactrocera Oleae

Servizio tecnico Tergeste Dop: Copetti 3382006129 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersas: Gori 3389385559