



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**
Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 11 del 17 luglio 2026

Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	3
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	3
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3
<i>OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)</i> e <i>PIOMBATURA (Pseudocercospora cladosporioides)</i>	4
GESTIONE AGRONOMICA	5
<i>STRESS TERMICO DELLE DRUPE</i>	5

ANDAMENTO METEO

Il fine settimana sarà caratterizzato dall'avvicinamento di una saccatura che interromperà l'ondata di caldo afoso africano. Tra sabato e domenica si attende un aumento della variabilità con temporali sparsi, localmente anche forti, e un calo delle temperature massime. L'inizio della prossima settimana vedrà un cambio della circolazione: è previsto l'afflusso di correnti più secche e fresche, che favoriranno un miglioramento con condizioni più stabili.

FENOLOGIA

Prosegue l'accrescimento delle olive, siamo allo stadio di indurimento del nocciolo per la cultivar Bianchera e pre-indurimento per la cultivar Leccino e Lecciana.




Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a San Quirino (PN) e a Nimis (UD)



Foto 3 e 4. Varietà Leccino Caneva (PN) e a Gemona (UD)



Foto 5. Varietà Lecciana a Moruzzo (UD)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	13/07/2026
UD	Cividale	20 adulti + 3 neanidi
UD	Moruzzo	42 adulti
PN	Caneva	8 adulti

I monitoraggi di questa settimana evidenziano una fluttuazione positiva, con un calo delle catture nelle trappole e delle presenze nei campi rispetto alla settimana precedente. La necessità di intervenire va valutata caso per caso, concentrando l'attenzione prevalentemente sulle varietà più tardive o laddove si riscontrino ancora attacchi attivi.

Per il controllo abbattente delle neanidi di cimice asiatica è possibile utilizzare il piretro naturale, avendo cura di eseguire il trattamento nelle ore serali per massimizzarne l'efficacia.

Per chi ha già impiegato polveri di roccia (caolino, zeolite, carbonato di calcio o bentonite) e ha subito il dilavamento a causa di recenti piogge, si consiglia di ripetere l'applicazione. Data l'attuale assenza di precipitazioni e l'utilità di questi prodotti come repellenti contro le ovideposizioni della mosca olearia, si raccomanda di miscelarli con un adesivante, per prolungarne la persistenza sulla pianta, e con un bagnante, così da garantire una distribuzione perfettamente omogenea sulla drupa.

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)




Il monitoraggio ha rilevato un aumento delle catture di mosca olearia nella provincia di Udine.

Come strategia preventiva è necessario installare le trappole per la cattura massale (gialle cromotropiche e/o a feromoni) nei propri oliveti. In alternativa è consigliato l'uso di esca adulticida a base di Sipnosad dove si sono rilevate le prime catture del dittero.

L'utilizzo di prodotti repellenti quali caolino e zeolite risultano efficaci durante questa fase. Si raccomanda l'utilizzo di un adesivante/bagnante per evitare il dilavamento da eventuali precipitazioni ed aumentare l'efficacia di distribuzione del prodotto.

Di seguito si riporta la tabella delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e la differenza tra insetto adulto femmina e maschio:

Prov.	Comune	29ª settimana
UD	Cividale	0
UD	Gemona	3 femmine + 10 maschi
UD	Majano	0
UD	Moruzzo	0
UD	Nespolo	2 maschi
UD	Nimis	0
UD	Caneva	1 maschio
PN	Montereale V.	0
PN	Polcenigo	0
PN	S. Quirino	2 femmine + 6 maschi
UD	Osoppo	2 femmine + 1 maschio
UD	Pozzuolo	1 maschio
UD	Faedis	0
UD	Povoletto	2 femmine
UD	Rive d'Arcano	0
UD	Latisana	1 femmina + 1 maschio
UD	Castions di S.	0
UD	Premariacco	0



OCCHIO DI PAVONE (Spiloea oleagina) e PIOMBATURA (Pseudocercospora cladosporioides)

Negli oliveti in cui c'è già un livello alto di infestazione pregressa, si raccomanda l'impiego di prodotti rameici. Si raccomanda, tuttavia, la massima cautela nell'uso del rame per evitare il rischio di filloptosi. Pertanto, si consiglia di evitare i trattamenti nelle ore calde ed optare per formulati che rilasciano una minor quantità di ioni rameici e allo stesso tempo garantiscono resistenza al dilavamento (ad esempio l'ossicloruro, poltiglia bordolese).

Prima di effettuare l'intervento fitosanitario, è sempre consigliato verificare l'effettivo grado di incidenza del patogeno.



CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: olioevofvg@pec.it

Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: info@oliofvg.it

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

GESTIONE AGRONOMICA

STRESS TERMICO DELLE DRUPE



È consigliato monitorare lo stato idrico del terreno ed intervenire con irrigazioni per chi ha possibilità. L'applicazione deve essere fatta quando le temperature giornaliere sono più miti. È possibile intervenire con una concimazione fogliare a base di estratti di alga, utile per sostenere lo sviluppo dei frutticini e contrastare lo stress termico della pianta.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSa 338-9385559