



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**
Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 12 del 24 luglio 2026

Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	3
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	3
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	4
<i>OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)</i> e <i>PIOMBATURA (Pseudocercospora cladosporioides)</i>	5

ANDAMENTO METEO

Fino a sabato il meteo si mantiene stabile e soleggiato con temperature in diminuzione, mentre nella giornata di domenica transiterà un fronte perturbato con piogge e rovesci diffusi su tutta la regione e le temperature subiranno un deciso calo (massime sui 21°C). Dall'inizio della prossima settimana ci sarà un rapido miglioramento con ritorno a condizioni estive stabili e grazie al ritorno del anticiclone africano il caldo ritornerà in progressiva e forte intensificazione. I cieli saranno sereni con massime in rapida ascesa, dai 27°C di lunedì fino a punte di 32-33°C verso fine della prossima settimana.

FENOLOGIA

Prosegue lo stadio di indurimento del nocciolo per la cultivar Bianchera e pre-indurimento per la cultivar Leccino e Lecciana. In alcune zone della bassa pianura le cultivar stanno entrando verso il secondo stadio di ingrossamento dei frutti.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Montereale Valcellina (PN) e a Nespolo (UD)



Foto 3 e 4. Varietà Leccino a Caneva (PN) e a Nimis (UD)



Foto 5. Varietà Lecciana a Moruzzo (UD)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	20/07/2026
UD	Cividale	30 adulti + 1 neanidi
UD	Moruzzo	86 adulti
PN	Caneva	12 adulti

La necessità di intervenire va valutata caso per caso, concentrando l'attenzione prevalentemente sulle varietà più tardive o laddove si riscontrino ancora attacchi attivi.

Si raccomanda di valutare l'applicazione di eventuali trattamenti con il supporto di un tecnico.

La pressione del fitofago sulle colture sta progressivamente cambiando dinamica grazie allo sviluppo dei frutti. Man mano che la drupa completa la fase di indurimento del nocciolo, la suscettibilità dell'oliva diminuisce. Sebbene la cimice, se ancora presente in oliveto, continuerà a pungere le olive, i danni non saranno così rilevanti, poiché la successiva fase di ingrossamento dell'oliva è decisamente meno sensibile rispetto a quella iniziale di post-allegagione.





Foto 6. Adulti in accoppiamento a Moruzzo (UD)

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Di seguito si riporta la tabella delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e la differenza tra insetto adulto femmina e maschio:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana
UD	Cividale	0	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m
UD	Majano	0	1 m
UD	Moruzzo	0	2 m
UD	Nespolo	2 m	1 m
UD	Nimis	0	5 m
UD	Caneva	1 m	0
PN	Montereale V.	0	1 m
PN	Polcenigo	0	0
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0
UD	Pozzuolo	1 m	1 f
UD	Faedis	0	2 f + 1 m
UD	Povoletto	2 f	0
UD	Rive d'Arcano	0	2 m
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m
UD	Castions di S.	0	1 m
UD	Premariacco	0	0



I rilievi effettuati sulla rete regionale di monitoraggio indicano una situazione complessivamente tranquilla nella maggior parte delle postazioni (non ci sono ancora ovideposizioni) e con infestazione attiva ancora pari a zero.

Si raccomanda a tutti gli olivicoltori di eseguire il monitoraggio aziendale ed eventualmente il campionamento dei frutti (in questo momento è possibile campionare 50 olive prelevate a campione nell'appezzamento) **per verificare la presenza di punture di ovideposizione o la presenza di uova.**

Al fine di mantenere basse le popolazioni adulte e in un'ottica preventiva, si consiglia di intervenire tempestivamente con **esche a base di Spinosad** (max. 8 interventi/anno).



CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: olioevofvg@pec.it

Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: info@oliofvg.it

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

In tutte le zone dove l'infestazione attiva è pari a 0%, l'impostazione deve essere preventiva:

- Trattamenti protettivi con **polveri di roccia**: si consiglia l'applicazione di caolino (o bentonite) alla dose indicata in etichetta. Il caolino svolge un'azione meccanica deterrente, oltre a ridurre la temperatura superficiale delle drupe e a proteggere dai colpi di sole.
- Trappole di cattura massale/attract & kill: qualora non ancora installate, posizionare le **trappole** per il contenimento degli adulti prima di eventuali picchi della seconda generazione.

Si consiglia di provvedere alle applicazioni dei trattamenti con esche adulticide e delle polveri di roccia dopo le piogge del fine settimana.

*OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*) e PIOMBATURA (*Pseudocercospora cladosporioides*)*

Negli oliveti in cui c'è già un livello alto di infestazione pregressa, si raccomanda l'impiego di prodotti rameici. Si raccomanda, tuttavia, la massima cautela nell'uso del rame per evitare il rischio di filloptosi. Pertanto, si consiglia di evitare i trattamenti nelle ore calde ed optare per formulati che rilasciano una minor quantità di ioni rameici e allo stesso tempo garantiscono resistenza al dilavamento (ad esempio l'ossicloruro, poltiglia bordolese).

Prima di effettuare l'intervento fitosanitario, è sempre consigliato verificare l'effettivo grado di incidenza del patogeno.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERS 338-9385559