



CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 16 del 21 agosto 2026

Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA	2
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	2
<i>MARGARONIA (Palpita unionalis)</i>	3
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	4
GESTIONE AGRONOMICA	6
POTATURA ESTIVA	6

ANDAMENTO METEO

A partire da giovedì un fronte temporalesco coprirà l'intero territorio regionale portando instabilità piovosa e un calo delle temperature per tutto il fine settimana. L'instabilità durerà per tutta la settimana successiva con frequenti temporali e piogge alternate a temporanee schiarite, unitamente a un generale calo delle temperature (con massime tra 25°C e 28°C e minime tra 17°C e 21°C).

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla gestione della mosca dell'olivo al termine dell'ondata di maltempo. Il quadro meteorologico previsto per la fine di agosto porta con sé due fattori altamente favorevoli per l'attività del dittero. Il calo delle temperature interromperà la stasi dell'insetto dopo il caldo, rendendo gli adulti decisamente più attivi, mobili e pronti a riprendere l'ovideposizione sulle drupe, e le piogge intense e frequenti provocheranno il completo dilavamento dei prodotti fitosanitari applicati in precedenza, lasciando gli oliveti privi di protezione.

È fondamentale intervenire con estrema tempestività non appena le precipitazioni saranno cessate ripristinando subito la copertura protettiva dei trattamenti; si consiglia, inoltre, di intensificare i controlli sulle trappole di monitoraggio per valutare la reale pressione del fitofago nei singoli oliveti.

FENOLOGIA

La maggior parte delle cultivar, le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Nimis (UD) e Leccino a Polcenigo (PN)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	17/08/2026
UD	Cividale	26
UD	Moruzzo	119 + 2 neanidi
PN	Caneva	22

La presenza di adulti in numerosi oliveti monitorati è rimasta alta. Con il completamento dell'indurimento del nocciolo e l'ingrossamento della drupa, la suscettibilità dell'oliva diminuisce, rendendo i danni da puntura della cimice decisamente meno rilevanti rispetto alle prime fasi di sviluppo. Non sono consigliati trattamenti.

MARGARONIA (Palpita unionalis)

Dal monitoraggio sul territorio sono stati riscontrati danni da erosione su olive situate in prossimità dei germogli giovani colpiti da Margaronia.

Nelle prime fasi, le larve si nutrono delle foglie apicali più giovani, compromettendo lo sviluppo dei rametti. Questo danno ha ripercussioni dirette sul raccolto dell'anno successivo, poiché l'olivo fruttifica sui rami dell'anno precedente: la perdita dei germogli riduce quindi la potenziale capacità produttiva futura.

Le larve, inoltre, attaccano le olive in accrescimento rosicchiandone la polpa fino al nocciolo. Le erosioni sui frutti, oltre a ostacolarne la crescita, espongono i tessuti all'ossidazione e all'ingresso di funghi e batteri patogeni. Tutto ciò compromette seriamente la qualità delle drupe e dell'olio estratto, provocando un innalzamento dei perossidi e dell'acidità, con un conseguente declassamento del valore commerciale del prodotto.

Valutare con il tecnico di riferimento un trattamento con *Bacillus thuringiensis*.



Foto 3. Olive danneggiate dalla Margaronia.

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana	31 ^a settimana	32 ^a settimana	33 ^a settimana	34 ^a settimana
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0	0		1 m
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m	0
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0	1 m
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m	0
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0	0
PN	Monteral. V.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0	0
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0	0
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f	0
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	0	0
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0	0
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0	1
UD	Rive d'Arc.	0	2 m	1 f + 1 m	0	0	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	1 m	0
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° catt ure mos ca	Punt ure sterili	Uo va	Lar ve viv e 1. età	Larv e mor te 1. età	Lar ve viv e 2. età	Larv e mor te 2. età	Lar ve viv e 3. età	Larv e mor te 3. età	Pu pe viv e	Pup e mor te	Fori usci ta	% INFESTAZI ONE ATTIVA	% INFESTAZI ONE DANNOS A	% MORTAL ITA' I e II età
UD	Cividale	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Majano	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Nespolo	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Gemona	1	1	0	0	0	2	0	1	0	3	1	1	0	5	4
UD	Nimis	0	3	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1	0	3	6
PN	Caneva	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PN	Polcenigo	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PN	S. Quirino	0	4	0	0	2	0	7	0	10	0	3	1	0	14	18
PN	Mont. V.	0	3	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	8

UD	Rive D'Arcano	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Osoppo	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Povoletto	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	1	4	0	1	3	0	1	0	2	0	1	0	1	3	4
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Castions di Strada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Foto 4 e 5. Danni su olive da mosca dell'olivo e foto di larva di III età morta.

Le elevate temperature registrate nei mesi di giugno, luglio e nella prima metà di agosto hanno esercitato un'azione di contenimento naturale, inducendo una stasi estiva e rallentando notevolmente l'ovideposizione della mosca dell'olivo.

Tuttavia, il quadro meteorologico è in rapido mutamento: la comparsa di eventi temporaleschi, unitamente al calo termico, determinerà condizioni microclimatiche altamente favorevoli per il dittero. Si prevede un forte incremento dell'attività di volo e della ricerca di drupe idonee all'ovideposizione.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Si raccomanda a tutti i produttori di intensificare il monitoraggio e i campionamenti delle olive in campo, verificando con attenzione la presenza di eventuali punture di ovideposizione.

Considerato l'effetto dilavante delle precipitazioni previste, sarà fondamentale ripristinare i trattamenti di gestione **immediatamente dopo la fine delle piogge**, non appena la vegetazione risulti asciutta. Si consiglia l'impiego di:

- **Esche proteiche attivate con Spinosad** (max. 8 trattamenti/anno)
- **Trattamenti di copertura repellenti con polveri di roccia** (caolino, zeolite)

GESTIONE AGRONOMICA

POTATURA ESTIVA

Si consiglia di effettuare l'eliminazione dei polloni e succhioni superflui.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSa 338-9385559