



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Biologica n° 18 del 14/09/2023

Andamento meteo

Nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni di rilievo, le temperature subiranno un lieve calo rispetto alla media.

Fenologia

In tutti gli areali la fenologia per la varietà Bianchera e Leccino è di secondo accrescimento del frutto. Nella zona di Muggia e nelle piante con poche olive è iniziata la maturazione della varietà Maurino e Leccino.



Foto: Maurino zona Muggia



Foto: Leccino: zona San Dorligo della Valle

Insetti:

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

In questa settimana in diverse località sono state rilevate catture in flessione del fitofago.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Foto: Larva di mosca olearia di 1° età



Foto: Larva di Mosca olearia di 3° età

Difesa: Visto il continuo aumento di adulti di mosca olearia, viene consigliato l' utilizzo di prodotti adulticidi per ridurre la presenza di adulti e rallentare l' infestazione, qualora si utilizzi il caolino/zeolite come repellente e le recenti piogge abbiano dilavato la copertura è consigliato il ripetersi dell' intervento.

Dall' analisi delle olive per calcolare l' infestazione è emerso che le olive trattate con caolino presentano una bassa o nulla infestazione rispetto a quelle trattate con prodotti adulticidi e soprattutto verso il campione non trattato.

Monitorare attentamente lo stato di infestazione del proprio oliveto

| Prov. | Comune | % INFESTAZIONE ATTIVA | % INFESTAZIONE DANNOSA | % INFESTAZIONE TOTALE |
|-------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| PN | Caneva | 24 | 28 | 52 |
| UD | Coseanetto | 2 | 16 | 18 |
| UD | Osoppo | 0 | 0 | 0 |
| UD | Gemona | 10 | 48 | 58 |
| UD | Polovetto | 0 | 4 | 4 |
| UD | Cividale | 11 | 25 | 36 |
| UD | Cividale | 2 | 20 | 22 |
| UD | Gonars | 11 | 33 | 44 |
| UD | Latisana | 0 | 0 | 0 |
| GO | Sagrado | 5 | 21 | 26 |
| GO | Ronchi | 6 | 23 | 29 |
| TS | Duino Aurisina | 3 | 13 | 16 |
| TS | Duino Aurisina | 0 | 7 | 7 |
| TS | Trieste | 9 | 21 | 30 |
| TS | Trieste | 10 | 13 | 23 |
| TS | San Dorligo | 8 | 26 | 34 |
| TS | San Dorligo della Valle | 6 | 24 | 30 |
| TS | San Dorligo della Valle | 9 | 29 | 38 |
| TS | San Dorligo | 2 | 21 | 23 |
| TS | San Dorligo | 7 | 22 | 29 |
| TS | Muggia | 9 | 23 | 32 |
| TS | Muggia | 1 | 17 | 18 |

Tabella: Infestazione settimanale



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
 c/o Camera di commercio di Trieste
 Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
 Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
 San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
 FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

| Prov. | Comune | Località | n° catture mosca |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------|
| PN | Caneva | Casagrande | 16 |
| PN | Caneva | Del marco | 52 |
| PN | Caneva | Stevenà | 47 |
| PN | Aviano | Aviano | 0 |
| UD | Coseanetto | Rive d' arcano | 14 |
| UD | Osoppo | Osoppo | 12 |
| UD | Gemona | Gemona | 19 |
| UD | Tricesimo | Tricesimo | 0 |
| UD | Ragogna | Ragogna | 45 |
| UD | Polovetto | Povoletto | 14 |
| UD | Pinzano | Pinzano | 29 |
| UD | Cividale | Spessa | 7 |
| UD | Cividale | Cividale | 12 |
| UD | Castions di Strada | Castions di Strada | 12 |
| UD | Gonars | Fauglis | 24 |
| UD | Carlino | Carlino | 0 |
| UD | Latisana | Latisana | 0 |
| GO | Sagrado | Sagrado | 1 |
| GO | Ronchi | Selz | 26 |
| TS | Duino Aurisina | Slivia | 4 |
| TS | Duino Aurisina | Sgonico | 21 |
| TS | Trieste | Contovello | 16 |
| TS | Trieste | Campanelle | 19 |
| TS | San Dorligo | Bagnoli | 3 |
| TS | San Dorligo della Valle | Moccò | 18 |
| TS | San Dorligo della Valle | Dolga Krona | 61 |
| TS | San Dorligo | Montedoro | 31 |
| TS | San Dorligo | Caresana | 8 |
| TS | Muggia | S.Barbara | 13 |
| TS | Muggia | Darsella S. Bartolomeo | 6 |

Tabella:
 catture settimanali
 mosca dell' olivo

- **Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)**

Dalla lettura delle trappole si evidenzia un calo generale della presenza dell' insetto.

Difesa: Non sono consigliati trattamenti.

| PUNTI MONITORAGGIO | | Catture settimana |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Comune | Località | 11 set – 17 set |
| PN | Caneva | 29 adulti + 7 neanidi |
| UD | Gemona | 11 adulti |
| UD | Ragogna | 16 adulti + 1 neanidi |
| UD | Cividale del Friuli | 0 |
| GO | Ronchi dei Legionari | 1 neanide |
| TS | Sgonico | 2 adulti e 11 neanidi |
| TS | Montedoro - San Dorligo della Valle | 1 adulti + 3 neanidi |
| TS | Montecelo - San Dorligo della Valle | 4 adulti + 40 neanidi |
| TS | Muggia | 4 neanidi |

Tabella: Catture settimanali Cimice marmorata asiatica

- **Margaronia (Palpita unionalis Hb)**

In parecchi areali è stata rilevata un'infestazione abbastanza importante di Margaronia, questo



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

lepidottero colpisce gli apici fogliari creando defogliatura più o meno marcata, talvolta colpisce anche le drupe asportandone una parte di polpa favorendo l'ingresso di altri patogeni secondari come funghi ed altri insetti.



Foto: azione trofica di Margaronia

Difesa: Si consiglia in caso di forte infestazione di ripetere il trattamento con bacillus Thuringensis, tale intervento si dovrà effettuare verso le ore serali per evitare che il batterio si devitalizzi.

Gestione agronomica

Effettuare sfalci e trinciature del manto erboso per ridurre il ristagno di umidità e per limitare lo sviluppo di patologie funginee (Occhio di Pavone o Piombatura).