

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE  
del 12 maggio 2015**

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Le informazioni tecniche, di seguito riportate, riguardano la difesa dalle principali avversità per la coltura della vite gestita con il metodo biologico.

**SITUAZIONE METEOROLOGICA**

Il promontorio di alta pressione che interessa l'Italia tende ad attenuarsi. Mercoledì e giovedì affluiranno correnti occidentali in quota che porteranno lieve instabilità in montagna. Da giovedì sera arriverà una depressione atlantica che interesserà anche la nostra regione. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito <http://www.osmer.fvg.it>

Le piogge dell'1 e 2 maggio hanno interessato gran parte della regione, mentre un successivo evento piovoso tra il 6 e il 7 maggio ha riguardato una zona più ristretta, compresa tra l'alta pianura e la zona collinare o pedemontana. In questa occasione si sono verificate precipitazioni localmente intense e in taluni casi eventi grandinigeni. Il 9 maggio solo localmente si sono avute piogge di una certa intensità.

**FENOLOGIA**

Tutte le varietà tendono ad uniformare le fasi fenologiche e si presentano con un numero di foglie spiegate che va dalle 3 per le varietà più tardive alle 6 per quelle più precoci; i grappolini sono visibili o separati.

Al seguente link è possibile consultare le fasi fenologiche BBCH e Baggiolini; <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/vite/BBCHvsBaggioliniDefinitivo.pdf/view>

La tabella seguente riporta la fenologia rilevata presso l'Azienda Pantianicco di Beano di Codoipo (UD) il 12 maggio.

<b>VARIETÀ</b>	<b>9 apr</b>	<b>15 apr</b>	<b>22 apr</b>	<b>29 apr</b>	<b>05 mag</b>	<b>12 mag</b>
Cabernet Franc	01	05	08	12-13 / 53	13 / 53	16 / 55
Cabernet Sauvignon	01	05	05-07	10	13 / 53	15 / 55
Carmenere	01	05	06-08	11	13 / 53	16 / 55
Chardonnay	01-05	10	11	14 / 53	15 / 55	18 / 55
Glera	07	11	13	15 / 55	16 / 55	18 / 55
Malvasia Istriana	01	05	05	10	12 / 53	15 / 55
Merlot	01	05	06-10	12 / 53	14 / 55	16 / 55
Picolit	05	09	09-10	14 / 53	15 / 55	17 / 55

Pinot Bianco	01	07	10	14 / 53	15 / 55	17 / 55
Pinot Grigio	01	07	10	13 / 53	14 / 55	17 / 55
Refosco p.r.	01	09 - 10	12	14 / 55	15 / 55	18 / 55
Ribolla Gialla	01	09	11	13 / 53	14 / 53	17 / 55
Sauvignon	01	05	10	12 / 53	13 / 53	16 / 55
Terrano	01 - 05	09 - 10	12	14 / 53	15 / 55	17 / 55
Tocai Friulano	01	05	10	13 / 53	14 / 53	17 / 55
Traminer Aromatico	05	09 - 10	12	14 / 55	14 / 55	17 / 55
Verduzzo Friulano	05	09	11	13 / 55	14 / 53	18 / 55

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

### Peronospora

Le piogge dell'1 e 2 maggio possono aver dato inizio ad infezioni, riscontrate in vigneti testimone con l'osservazione delle prime macchie. Anche le piogge del 6 - 7 maggio possono aver dato inizio a infezioni primarie dove cadute con una certa intensità. Lo stesso potrebbe essersi verificato il 9, tuttavia in altre località. Sul sito ERSA all'indirizzo <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsionali-e-monitoraggio/vite/>

è possibile consultare alcuni modelli previsionali per peronospora applicati in diverse località della Regione.

### Oidio

Il periodo dell'anno e lo stadio fenologico della vite sono predisponenti alle infezioni ascosporiche, che possono essere favorite da condizioni meteorologiche caratterizzate da elevata umidità. In alcuni vigneti ricorrentemente colpiti sono state riscontrate le prime infezioni su foglia.

## STRATEGIE DI DIFESA

### Peronospora

Considerando le possibili infezioni in atto o già evase, probabili qualora le piogge avessero dilavato la copertura o trovato vegetazione scoperta, e le diffuse precipitazioni previste a partire dalla serata di giovedì 14 si consiglia di intervenire **entro la giornata di giovedì 14** con prodotti a base di rame a dosaggi medio - alti, considerando sempre i quantitativi annui ammessi.

### Oidio

In abbinamento al trattamento antiperonosporico si consiglia di utilizzare zolfo micronizzato a dosi medio - alte

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**