

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE del 01 giugno 2016

INFORMAZIONI GENERALI

- Le informazioni tecniche, di seguito riportate, riguardano la difesa dalle principali avversità per la coltura della vite gestita con il metodo biologico.

SITUAZIONE METEOROLOGICA (Previsioni Osmer - Arpa del 01 giugno 2016)

Giovedì 02 giugno 2016

Tempo incerto ed instabile con cielo da variabile a nuvoloso, piogge sparse in genere moderate e locali temporali con piogge più abbondanti. Possibili schiarite più probabili sulla costa e dal pomeriggio.

Venerdì 03 giugno 2016

Tempo ancora incerto. Probabilmente avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla costa, variabile in pianura, nuvoloso sui monti con piogge sparse in giornata e qualche temporale pomeridiano. Nel pomeriggio qualche temporale sarà possibile anche in pianura, più bassa la probabilità sulla costa dove soffierà in genere vento da sud moderato.

Sabato 04 giugno 2016

Tempo incerto ed instabile con cielo variabile, rovesci e temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore. In genere si avranno più schiarite sulla costa e più nubi sui monti.

Domenica 05 giugno 2016

Tempo incerto ed instabile con cielo variabile, rovesci e temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore. In genere si avranno più schiarite sulla costa e più nubi sui monti.

Maggiori informazioni sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

In gran parte dei vigneti è iniziata la fioritura. I vigneti di Pinot grigio e Chardonnay, nella gran parte della regione, si trovano in piena fioritura (fase 65 scala BBCH).

Con l'entrata in fioritura inizia il periodo di massima sensibilità della vite a peronospora, oidio e black rot.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

Dai rilievi effettuati nei vigneti testimoni non trattati è risultato che le infezioni primarie del periodo 11-15 maggio sono state di forte entità.

Sporadiche segnalazioni di macchie si sono avute anche in alcuni vigneti trattati.

Si raccomanda ai viticoltori di controllare attentamente i vigneti per verificare la presenza o meno di macchie nei diversi appezzamenti in modo da adottare le più opportune strategie di difesa.

Oidio

Continuano le segnalazioni di presenza di sintomi

STRATEGIE DI DIFESA**Peronospora**

Si consiglia di effettuare un intervento con 600 g/Ha di **RAME** metallo da Idrossido non appena le condizioni meteorologiche dovessero essere minimamente favorevoli all'effettuazione del trattamento.

Oidio

In abbinamento al trattamento antiperonosporico si consiglia di utilizzare zolfo micronizzato

Black rot

I prodotti rameici esplicano un'azione preventiva anche nei confronti di questo patogeno.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.