

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE del 29 luglio 2016

INFORMAZIONI GENERALI

- Le informazioni tecniche, di seguito riportate, riguardano la difesa dalle principali avversità per la coltura della vite gestita con il metodo biologico.

SITUAZIONE METEOROLOGICA (Previsioni Osmer - Arpa del 29 luglio 2016)

Sabato 30 luglio

Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza, sui monti variabile con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.

Domenica 31 luglio

Inizialmente bel tempo su gran parte della regione. In mattinata peggioramento a partire dai monti dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio i temporali si estenderanno alla pianura e verso sera, localmente, alla costa. Sarà possibile qualche temporale forte. Venti a regime di brezza, mentre in serata entrerà vento da nord.

Lunedì 01 agosto

Cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi e piogge localmente anche abbondanti. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Martedì 02 agosto

Cielo variabile con la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano sui monti. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino, Borino la sera.

Maggiori informazioni sul sito www.osmer.fvg.it

STRATEGIE DI DIFESA

Peronospora

In considerazione dell'andamento climatico di questo ultimo periodo e delle infezioni del parassita, che hanno colpito in modo consistente nel corso di questa stagione vegetativa i vigneti, si raccomanda di controllare quanto più possibile le infezioni secondarie, compatibilmente con le quantità di rame già distribuite.

Il limite massimo di rame metallo utilizzabile annualmente, 6 Kg/ha, per l'annata in corso è stato derogato. Con il Decreto di deroga (http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-biologica/normativa-regionale-agricoltura-biologica/Deroga_Rame_bio.pdf/view) è stato permesso, per quest'anno, l'utilizzo di ulteriori 2 Kg/ha di rame metallo, fermo restando il limite di 30 Kg/ha considerando l'annata in corso ed i quattro anni precedenti.

Oidio

In abbinamento al trattamento antiperonosporico si consiglia di utilizzare zolfo bagnabile micronizzato.

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE
ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**