

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE del 26 maggio 2016

INFORMAZIONI GENERALI

- Le informazioni tecniche, di seguito riportate, riguardano la difesa dalle principali avversità per la coltura della vite gestita con il metodo biologico.

SITUAZIONE METEOROLOGICA (Previsioni Osmer - Arpa del 26 maggio 2016)

Venerdì 27 maggio 2016

Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e venti di brezza. Sui monti, di pomeriggio, potranno formarsi locali annuvolamenti e non si esclude qualche isolato rovescio specie al confine col Cadore.

Sabato 28 maggio 2016

Prosegue il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locale nuvolosità pomeridiana sui monti con bassa probabilità di qualche isolato rovescio. Venti a regime di brezza. Farà relativamente caldo di giorno in pianura.

Domenica 29 maggio

Di primo mattino ancora tempo discreto, in giornata graduale peggioramento e dal pomeriggio piogge e temporali a partire da ovest, con vento di Scirocco moderato.

Lunedì 30 maggio

Nuvolosità variabile con temporali sparsi e piogge da abbondanti a localmente intense. Soffierà Libeccio moderato.

Maggiori informazioni sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

I vigneti di Pinot grigio e Chardonnay in gran parte della regione si trovano ad inizio della fioritura (fase 60 scala BBCH). Le altre varietà si trovano nella fase di grappoli distesi. Con l'entrata in fioritura inizia il periodo di massima sensibilità della vite a peronospora, oidio e black rot.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

All'inizio di questa settimana nei vigneti testimoni non trattati sono comparse le macchie di peronospora primaria su tutto il territorio regionale, con una presenza maggiore nelle zone occidentali, dove le piogge avvenute a partire dal 11 del mese sono state più elevate. Sporadiche segnalazioni di macchie si sono avute anche in alcuni vigneti trattati. Si raccomanda ai viticoltori di controllare attentamente i vigneti per verificare la presenza o meno di macchie nei diversi appezzamenti in modo da adottare le più opportune strategie di difesa.

Oidio

Continuano le segnalazioni di presenza di sintomi specie nella zona orientale della regione, soprattutto nei vigneti che storicamente presentano focolai della malattia.

STRATEGIE DI DIFESA

Peronospora

Lo stadio fenologico particolarmente suscettibile richiede molta attenzione nei tempi e nelle modalità di distribuzione delle miscele fungicide.

Si consiglia di effettuare un intervento con 600 g/Ha di **RAME** metallo da Idrossido(verificando la percentuale di rame in etichetta ed utilizzando, con attrezzature a volume normale, 9 hl/Ha di soluzione) nei prossimi giorni, prima delle piogge previste per domenica.

Se si dovessero verificare tra domenica 29 maggio e i primi giorni della settimana entrante precipitazioni superiori a 20-30 mm, ripristinare quanto prima la copertura con le modalità descritte.

Oidio

In abbinamento al trattamento antiperonosporico si consiglia di utilizzare zolfo micronizzato

Black rot

I prodotti rameici esplicano un'azione preventiva anche nei confronti di questo patogeno.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.