

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE 13 aprile 2017

INFORMAZIONI GENERALI

- Le informazioni tecniche, di seguito riportate, riguardano la difesa dalle principali avversità per la coltura della vite gestita con il metodo biologico.

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Ieri non si sono avute precipitazioni su tutta la pianura.

Una possibilità di pioggia è prevista nelle giornate di sabato e domenica di Pasqua.

Seguire comunque gli aggiornamenti meteo dei prossimi giorni in quanto l'evoluzione è incerta e i quantitativi di pioggia sembrano in diminuzione.

FENOLOGIA

La tabella con le fasi fenologiche BBCH è scaricabile al link:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/vite/BBCHvsBaggioliniDefinitivo.pdf>

Le varietà Glera e Refosco dal peduncolo rosso mediamente si trovano nella fase di sviluppo delle foglie con 4-5 foglie spiegate e nei germogli apicali anche 6. Il Verduzzo friulano, lo Chardonnay e il Pinot grigio presentano 2 foglie sviluppate con germogli intorno ai 10 cm. Tutte le altre varietà hanno uno sviluppo dei germogli inferiore.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Peronospora

Ancora non si sono verificate le condizioni per l'avvio delle infezioni primarie.

STRATEGIE DI DIFESA

Peronospora

Visto il perdurare del periodo secco le prossime piogge previste per sabato e domenica sono da considerarsi preparatorie per le spore del fungo e non in grado di determinare infezioni alla vegetazione.

Solo le successive piogge potranno risultare infettanti se le condizioni di temperatura risulteranno sufficienti.

Si ricorda che la quantità media di rame metallo effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti, non deve essere superiore ai 6 kg/ha/anno.

Oidio

La difesa contro questo fungo si effettua contemporaneamente a quella antiperonosporica utilizzando zolfi bagnabili. Nei vigneti che nelle annate precedenti presentavano forti attacchi utilizzare i dosaggi massimi.

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE
ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**