

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA****BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE n. 2 del 13 aprile 2018****SITUAZIONE METEOROLOGICA**

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Dopo le piogge è previsto un fine settimana con tempo buono con innalzamento delle temperature soprattutto quelle massime il sabato e la domenica.

FENOLOGIA

La tabella con le fasi fenologiche BBCH è scaricabile al link:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/vite/BBCHvsBaggioliniDefinitivo.pdf>.

Le varietà a germogliamento precoce (es. Glera, Chardonnay, Verduzzo Friulano, ecc.) mediamente si trovano nella fase di inizio germogliamento (08-09 BBCH). Il Pinot grigio è tra la fase di gemme cotonose e inizio germogliamento (05-07BBCH). La ribolla gialla è in fase gemma cotonosa (05 BBCH). Le altre varietà sono tra la fine dell'ingrossamento gemme e la fase di gemme nel cotone (BBCH 03-05).

SITUAZIONE FITOSANITARIA**Cocciniglie**

I monitoraggi eseguiti nell'ultima settimana hanno evidenziato le primissime migrazioni da parte delle femmine di *Parthenolecanium corni* lungo i capi a frutto; i vigneti riscontrati sono solo due, posti ad est della regione e in zone molto precoci.

Le cocciniglie della vite (*Planococcus ficus*, *Parthenolecanium corni* e *Neopulvinaria innumerabilis*) sono tra i parassiti della vite più difficili da controllare anche se nelle ultime due annate (2016 e 2017) si è ridotta sensibilmente la presenza nei vigneti rispetto al 2015.

Normalmente nei vigneti biologici c'è una maggior presenza di insetti antagonisti naturali che limitano gli attacchi delle cocciniglie.

Escoriosi

I controlli eseguiti negli ultimi sette giorni confermano una presenza medio-bassa dell'inoculo nei vigneti

STRATEGIE DI DIFESA**Cocciniglie**

Vista la bassa diffusione risultante dai monitoraggi e comunque la bassa migrazione riscontrata non si ritengono necessari interventi con oli minerali.

Si invitano i viticoltori, che hanno avuto nei vigneti forti attacchi di cocciniglie nella stagione scorsa, a contattare i tecnici di riferimento operanti sul territorio in caso di dubbi sulla specie, per valutare il grado di infestazione, se è necessario intervenire con trattamenti con olio

minerale e il posizionamento migliore in funzione della migrazione (per *Parthenolecanium corni*).

Escoriosi

L'evoluzione meteo dei prossimi giorni è tale da non richiedere trattamenti preventivi contro il patogeno neanche nei vigneti delle varietà a germogliamento precoce anche nelle zone più anticipate della regione.