

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA****BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE n. 4 del 27 aprile 2018
SITUAZIONE METEOROLOGICA**

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Le piogge della serata scorsa hanno interessato in maniera più consistente parte dell'alta pianura pordenonese (in particolare Montereale Valcellina, Valvasone, Vivaro) e la Media pianura udinese (Sedegliano, Codroipo, Bicinicco). Le previsioni indicano un fine settimana buono con temperature ancora elevate. Un debole peggioramento è previsto tra domenica sera e lunedì mattina (da verificare l'evoluzione nei prossimi giorni). Ad oggi sembra che un peggioramento più consistente si possa verificare da mercoledì.

FENOLOGIA

La tabella con le fasi fenologiche BBCH è scaricabile al link:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/vite/BBCHvsBaggioliniDefinitivo.pdf>.

Le varietà a germogliamento precoce (es. Glera, Chardonnay, Verduzzo Friulano, ecc.) mediamente presentano tra le 5 e 6 foglie distese (fase 15-16 BBCH) con infiorescenze chiaramente visibili. Il Pinot grigio presenta 4-5 foglie distese (fase 14-15 BBCH). Anche le varietà a germogliamento tardivo hanno raggiunto la fase di recettività delle infezioni peronosporiche (oltre 10 cm di sviluppo germogli). Solo in alcuni vigneti dell'alta pianura condotti con metodo biologico le varietà tardive sono in fase di 1-2 foglie distese.

SITUAZIONE FITOSANITARIA**Peronospora**

Le piogge della scorsa notte sono da considerarsi preparatorie ai fini dello sviluppo delle oospore di peronospora pure nelle aree in cui si sono superati i 10 mm di precipitazione anche per le limitate ore di bagnatura.

Acariosi

Si segnala la presenza in alcuni vigneti di acari eriofidi agenti dell'acariosi con arresto dell'accrescimento dei germogli. In casi dubbi si consiglia di contattare i tecnici di riferimento per una valutazione sulle strategie da adottare.

Virosi del Pinot grigio

In questi giorni sono comparse sulle viti i primi sintomi di questa virosi. Le varietà più colpite sono il Pinot grigio, il Tocai friulano, il Traminer aromatico e il Glera.

STRATEGIE DI DIFESA**Peronospora**

In questa fase i prodotti di copertura consigliati con il precedente bollettino garantiscono una protezione della vegetazione per circa 7 giorni.

- Le aziende che non hanno ancora eseguito il primo trattamento devono posizionare un intervento con prodotti a base rameica **il più a ridosso possibile della prossima pioggia** (domenica-lunedì se confermata).
- Le aziende che sono già intervenute possono considerarsi coperte sulle piogge previste per domenica e lunedì anche dove si sono avute piogge. Queste dovranno **intervenire prima delle piogge previste per mercoledì.**

Oidio

Abbinare ai prodotti antiperonosporici zolfi bagnabili ai dosaggi medi.

Solo nei casi di vigneti che nelle annate precedenti presentavano forti attacchi utilizzare zolfi ai dosaggi massimi.

In questa fase i prodotti vanno dosati, per attrezzature a volume normale, considerando un impiego di 5 hl/ha di miscela fungicida.