

AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	cultura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
CERCOSPORA SPP.	<i>Cercospora beticola</i>	Interventi chimici: - per l'inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei bollettini locali di assistenza tecnica o al raggiungimento delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie.	Interventi agronomici: - scelta di cv resistenti o tolleranti. In Tab. 1 è riportata la sensibilità varietale alla cercospora della bietola da zucchero.	Prodotti rameici	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi, 4 interventi per gli estirpi tardivi dopo il 10 settembre
				Difenoconazolo				G1	1	3*	(*) Gli IBE sono efficaci anche contro il mal bianco. Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta all'anno.			
				Tetraconazolo				G1						
				Bacillus subtilis				BM						
				Fenpropidin				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2	1				
OIDIO DELLA BIETOLA	<i>Erysiphe betae</i>		Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo	SI			Inorganici	M					
				Bacillus subtilis	SI			Batterici - Bacillus spp.	BM					
RHIZOCTONIA SPP.	<i>Rhizoctonia sp.</i>		Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturale (escludere dall'avvicendamento i prati da leguminose) - facilitare lo sgrondo delle acque - lavorazione del suolo per avere una buona struttura - corretta gestione dell'irrigazione.											
Virus della rizomania		Interventi agronomici: - ricorrere a varietà tolleranti nei terreni rizomani.	Interventi agronomici: - lunghe rotazioni colturali.											
FITOFAGI													Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.	
ALTICA DELLA BARBABIETOLA	<i>Chaetocnema tibialis</i>	Soglia: - fori su foglie cotiledonari - 2 fori/foglia su piante con 2 foglie - 4 fori/foglia su piante con 4 foglie.		Taufluvinate				Piretroidi e piretrine	3				Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.	
				Etofenprox				Piretroidi e piretrine	3	1*		(*) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdaclotrina		
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3	1*		(*) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdaclotrina		
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	1				
				Teflutrin				Piretroidi e piretrine	3		1*	(*) Applicazione localizzata, in alternativa ad altri geodisinfestanti (lambdaclotrina)		
ATOMARIA DELLA BARBABIETOLA	<i>Atomaria linearis</i>		Temibile solo in casi di risemine.									Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.		
ELATERIDI	<i>Agriotes sp.</i>	Soglia: - presenza accertata - soglia con i vasetti : 1 larva per trappola - con i carotaggi la soglia è di 15 larve/m².	Con infestazioni in atto per creare un ambiente sfavorevole alle larve eseguire sarchiature ripetute.	Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3		1*	Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.		
				Teflutrin				Piretroidi e piretrine	3			(*) Geodisinfestanti, applicazione localizzata.		
CLEONO DELLA BARBABIETOLA	<i>Conorhynchus mendicus</i>	Soglia: - erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile - superamento di 2 adulti per vaso/settimana.	Effettuare il primo trattamento sui bordi dell'appezzamento, poi intervenire a pieno campo contro gli adulti.	Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3			Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.		
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3	1*		(*) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdaclotrina		
				Taufluvinate				Piretroidi e piretrine	3					
LISSO	<i>Lixus juncii</i>		Interventi agronomici: - programmare una rotazione almeno quadriennale specialmente in caso di gravi infestazioni nelle annate precedenti Interventi chimici: - intervenire alla comparsa degli adulti.	Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3					
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3	1*			(*) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdaclotrina	
NOTTUE FOGLIARI	<i>Mamestra brassicae; Spodoptera exigua; Autographa gamma</i>	Soglia: - 2-3 larve/pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare.		Bacillus thuringiensis	SI				11				Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.	(*) Con piretroidi al massimo 1 intervento contro questa avversità
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	*				
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3	*	1**		(**) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdaclotrina	
				Etofenprox				Piretroidi e piretrine	3	*				
				Taufluvinate				Piretroidi e piretrine	3					
AFIDE NERO DELLA FAVA	<i>Aphis fabae</i>	Soglia: - 30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e con mancanza di ausiliari.		Sali potassici di acidi grassi	SI								Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.	Intervento ammesso solo nelle aree infestate in assenza di coccinellidi.
				Taufluvinate				Piretroidi e piretrine	3					
				Esfenvalerate				Piretroidi e piretrine	3	1*			(*) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdaclotrina	
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3					
		Soglia:											Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno,	

AGROTIS SPP.	<i>Agrotis sp.</i>	- 1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq fino allo stadio di 8-10 foglie.		Deltametrina								senza considerare gli interventi con geodisinfestanti <i>Bacillus thuringiensis</i> e <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> .
CASSIDA DELLA BARBABIETOLA	<i>Cassida sp.</i>		Individuare i focolai iniziali all'interno e sui bordi dell'appezzamento.									Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti <i>Bacillus thuringiensis</i> e <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> .
				Deltametrina								
				Tau-fluvalinate								
NEMATODE CISTIFORME DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	<i>Heterodera schachtii</i>	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, Liliaceae - nei terreni fortemente infestati integrare l'avvicendamento con colture intercalari di piante esca resistenti (cv Pegletta, Nemax, Emergo di <i>Raphanus sativus</i> o <i>Sinapis alba</i>) da realizzare: - in primavera nei terreni messi a riposo (set-aside) - in estate (dopo grano o orzo) - in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (per es. soia, mais). <p>Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40 giorni dalla semina per evitare la deiscenza dei semi e favorire un inerbimento del terreno, o solamente trinciate per favorire un ricaccio della coltura nei terreni a riposo (set-aside) Nei terreni poco o moderatamente infestati (fino a 200-250 uova-larve per 100 g di terreno essiccato all'aria) coltivare cvs di Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode.</p>	<p>Si sconsiglia di usare in rotazione crucifere (colza, ravizzone, ravanello da seme, cavolo) poiché suscettibili al nematode.</p> <p>Tale limitazione non è valida per cvs resistenti di Rafano oleifero e Senape bianca.</p> <p>Porre attenzione nelle successioni con pomodoro. Nelle zone a rischio in autunno si consiglia di effettuare preventivamente l'analisi del suolo.</p> <p>In caso di infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100 uova-larve per 100 g di terreno essiccato all'aria, è sconsigliata la coltura in quanto ne viene compromessa la produzione.</p>									

Tab. 1 - Lista varietale e sensibilità alla cercospora.

NOME VARIETA'	CS	CL
FIAMMETTA KWS	KWS	M
GIACOMINA KWS	KWS	M
DOLEROSA KWS	KWS	M
SMART ROSSADA KWS	KWS	M
BTS 1820 N	BETASEED	M
AMERIVA KWS	KWS	M
BILJANA KWS	KWS	M
BENVENUTA KWS	KWS	M
BTS 2095N	BETASEED	M
BTS 1715	BETASEED	M
ESSENZIA KWS	KWS	M
GREGORIA KWS	KWS	M
VIOLA KWS	KWS	M
BTS 1740	BETASEED	M
SMART MATERIA KWS	KWS	M
OTTAVIA KWS	KWS	M
BTS 6975 N	BETASEED	M
ORAZIA KWS	KWS	M
BTS 2815 N	BETASEED	MS
CAMELEON	SESVanderHave	MS
SMART EVITA KWS	KWS	MS
YUCATAN	SESVanderHave	MS
ARUM	SESVanderHave	MS
CAROLL	STRUBE	MS
BTS SMART 9775 N	BETASEED	MS
BTS 4825	BETASEED	S
VLAD	STRUBE	S
BALI	SESVanderHave	S
BOTTICELLI	STRUBE	S
FERRET	SESVanderHave	S
RAISON	STRUBE	S
FITIS	SESVanderHave	S
OCTOPUS	SESVanderHave	S
SMART BRIGA KWS	KWS	S
SMART PERLA KWS	KWS	S
Sparrow Smart	SESVANDERHAVE	S
Litchi	SESVANDERHAVE	S
HELSINKI	SESVANDERHAVE	S
BISON PLUS	SESVANDERHAVE	NT
MOHICAN	SESVanderHave	NT
SMART DJERBA KWS	KWS	NT
Ventus	DLF	NT
MORINGA	SESVANDERHAVE	NT
RHINOCEROS	SESVANDERHAVE	NT
SANDPIPER SMART	SESVanderHave	NT
SMART RENJA KWS	KWS	NT
MARINELLA KWS	KWS	NT
Manatee Smart	SESVanderHave	NT
ELISKA KWS	KWS	NT
BTS 555	BETASEED	NT
MARSUPIAL SMART	SESVanderHave	NT