

AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'			
TICCHOLIATURA	<i>Venturia inaequalis</i>		Interventi chimici - interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli sensibilmente dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di ticchiolati.	Prodotti rameici	SI			Inorganici	M				26 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura				
				Bicarbonato di potassio	SI			0	NC	6							
				Zolfo	SI			Inorganici	M								
				Fosfonato di potassio				Fosfonati	P7	6							
				Captano				Fitinimidici	M	2		5					
				Diflufenicanone				Chinoni (antrachinoni)	M	3							
				Guardiane				Guardiane	U	2							
				Tebuconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	2							
MONILIOSI	<i>Monilia sp.</i>			Bicarbonato di potassio	SI		0	NC	6								
MAL BIANCO	<i>Podosphaera leucotricha;</i> <i>Oidium farinosum</i>		Interventi agronomici - esportare durante la potatura invernale i rametti con gemme interessate dalla malattia ed eliminare in primavera - estate i germogli colti Interventi chimici - sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio, interventi preventivamente sin dalla prefloritura, mentre negli altri casi attendere comparsa dei primi sintomi	Olio essenziale di arancio dolce	SI			Oli vegetali	F7								
				Tebuconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	2							
AFIDI	<i>Dysaphis plantaginea;</i> <i>aphis pom;</i> <i>Eriosoma lanigerum</i>			Olio minerale	SI			0	NC								
				Sali potassici di acidi grassi	SI			0	NC								
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A	2							
				Acetamiprid				Neonicotinoidi	4A	2							
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A	2							
CARPOCAPSA DELLE POMACEE	<i>Cydia pomonella</i>		Installare trappole a feromone per il monitoraggio Interventi chimici - soglia: intervenire in presenza di 2 adulti/trappola/settimar	CONFUSIONE E DISTRAZIONE SESSUALE	SI												
				Virus della granulosa	SI												
				Metossifenozide				Diacilidrazine	18	3							
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3	2							
				Spinosad	SI			Spinosine	5	3							
				Emamectina benzoato	SI			Avermectine	6	2							
				CONFUSIONE E DISTRAZIONE SESSUALE	SI												
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO	<i>Cydia molesta</i> o <i>Grapholita molesta</i>			Emamectina benzoato				Avermectine	6	2							
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3	2							
				Metossifenozide				Diacilidrazine	18	3							
				Spinosad	SI			Spinosine	5	3							
				CONFUSIONE E DISTRAZIONE SESSUALE	SI												
MOSCA DELLA FRUTTA	<i>Ceratitis capitata</i>	Soglia: - presenza di prime punture fertili		ESCHE ATTRATTIVE CON LAMBDA CIALOTRINA	SI												
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	2							
				Acetamiprid				Neonicotinoidi	4	2							
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3					Trappola attivata			