AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
MARCIUME DEL COLLETTO	*Phytophthora sp.*		Evitare i ristagni idrici e favorire i drenaggi.	*Trichoderma asperellum*	SI			Microrganismi						
				Trichoderma atroviride	SI			Microrganismi						
MUFFA GRIGIA	*Botrytis cinerea*		Corretta gestione irrigua, della chioma e della nutrizione	*Bacillus amyloliquefaciens*	SI			Microrganismi Bacillus sp	F6					
				Eugenolo	SI			Oli vegetali						
				Geraniolo	SI			Oli vegetali						
				Timolo	SI			Oli vegetali						
				Boscalid				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2					
OIDIO	*Erysiphe sp.*			*Zolfo*	SI			Inorganici	M					
ANTRACNOSI	*Sphaceloma=Gloeosporium punicae; Colletotrichum gloeosporioides*		Favorire l'arieggiamento della chioma adottando una potatura equilibrata											
AFIDI	*Aphis sp.*			*Sali potassici di acidi grassi*	SI									
COCCINIGLIA COTONOSA DEGLI AGRUMI	*Planococcus citri*		Favorire l'attività dei nemici naturali. Controllare le formiche in quanto maggiori diffusori degli pseudococcidi. Nel periodo invernale con la potatura eliminare le parti attaccate.	*Olio minerale*	SI									
MOSCA DELLA FRUTTA	*Ceratitis capitata*		Utilizzare trappole per cattura massale.	Attract and kill con: Deltametrina	SI									
				Spinosad	SI			Spinosine	5					
RODILEGNO GIALLO	*Zeuzera pyrina*		Eliminare le larve presenti nei fori più grandi con filo di ferro. Disinfettare e chiudere gli stessi con mastice.											
TIGNOLE														
NEMATODE GALLIGENO	*Meloidogyne sp.*			*Paecilomyces lilacinus*	SI									