AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
CANCRI	*Cytospora* sp.		Interventi agronomici: - durante la potatura asportare e bruciare le parti infette (rami secchi e/o con presenza di cancri) Interventi chimici: - intervenire alla caduta delle foglie o prima del risveglio vegetativo.	***Prodotti rameici***	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha d rame all'anno sulla coltura.	
				Boscalid				inibitori Succinato deidrogenasi SDH	C2	2				
				Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QO	C3					
CHAETOPTELIUS SPP.	*Chaetoptelius vestitus*		Interventi agronomici: - asportare con la potatura i rami e/o le branche infestate, raccoglier in fasci lasciarli in campo - bruciare gli stessi entro il mese di marzo e comunque prima che da essi sfarfallino i nuovi adulti.											
CIMICI	*Nezara viridula, Carpocoris* spp.	Interventi chimici: - alla comparsa delle prime infestazioni.		**Lambda-cialotrina**				Piretroidi e piretrine	3	2				
TIGNOLA DELLE FOGLIE DEL PISTACCHIO	*Teleiodes decorella*		Interventi chimici: - in presenza di infestazioni, trattare tempestivamente i focolai.	*Spinosad*	SI			Spinosine	5	2				
COCCINIGLIE	*Melanaspis* sp.		Interventi agronomici: - asportare con la potatura i rami infestati Interventi chimici: - trattare i focolai in presenza di neanidi in primavera.	*Olio minerale*	SI									
				Sali potassici di acidi grassi	SI									